2221B-01

“濟生”血液透析濃縮液 A-168

"Chi Sheng"

CHI SHENG

Hemodialysis Conc. A-168 3.8L

35X

簡介：血液透析濃縮液A-168為無色至淡琥珀色之鹽類濃縮液。

組成：每公升含有下列成分及含量：

Composition	Per Liter Concentration		Diluted 1:35
Sodium Chloride	210.7 gm	3605.0 mmol	103.0 mmol
Calcium Chloride $2H_2O$	7.72 gm	52.5 mmol	1.5 mmol
Potassium Chloride	5.22 gm	70.0 mmol	2.0 mmol
Magnesium Chloride $6H_2O$	3.56 gm	17.5 mmol	0.5 mmol
Acetic Acid Glacial	6.31 gm	105.0 mmol	3.0 mmol
Dextrose Monohydrate	77.00 gm	388.5 mmol	11.1 mmol

賦形劑：Purified water

適應症：血液透析液。

用法用量：

使用時將濟生血液透析濃縮液**A-168**溶液接於血液透析機器之**Acid Needle**後，再接上**Sodium Bicarbonate**之乾粉溶解之溶液後進行血液透析治療。(機器稀釋方式為**1 L A-168 + 32.775 L** 純水 **+ 1.225 L 8.4% $NaHCO_3$**溶液)

Instruction: To be used only and immediately after dilution with deionized water and addition of bicarbonate component without Sodium Chloride.(1 L A-168 + 32.775 L Water + 1.225 L $NaHCO_3$-Sol 8.4%)

其離子濃度分別如下：

Formula	Na mEq/L	Ca mEq/L	K mEq/L	Mg mEq/L	Cl mEq/L	Acetate mEq/L	Bicarbonate mEq/L	Dextrose mg/dL
A-168	103.0	3.0	2.0	1.0	109.0	3.0	0	200.0
8.4% $NaHCO_3$	35.0	-	-	-	-	-	35.0	-
總量	138.0	3.0	2.0	1.0	109.0	3.0	35.0	200.0

注意事項：

1.本藥限由醫師使用。
2.本品無致熱原。
3.依照醫師處方，以適量的純水稀釋或依血液透析機的操作方式方可使用，稀釋後需立即使用。
4.如封蓋破損則不可使用，本品需保持密封。
5.本品不得使用於注射或供腹膜透析之用。
6.透析液稀釋前後若有沉澱發生，切勿使用。
7.儲存條件：密封存放於40℃以下，不可冷凍。

Lot. No:
Mfg. Date:
Exp. Date:

包裝：3.8L HDPE 塑膠桶裝。

衛部藥製字第 060349 號

藥商及製造廠:濟生醫藥生技股份有限公司 地址:新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號
CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD TEL:(03)598-3811(代表號)

Ca 3.0
Na 138.0