■効能・効果/胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

■用法・用量/成人(15歳以上)1回2錠、8歳以上15歳未満1回1錠、1日3回毎食後水又は温湯で服用してください。

■注意/(1)服用に際しては、添付文書をよく読んでください (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください (3)小児の手の届かない所に保管してください (4)使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください

開封
年月日　　年　月　日

X1275R　M3K

Kowa

胃腸薬

新キャベジンコーワS

MMSC
(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)

ソウジュツ乾燥エキス

リパーゼAP12

第2類医薬品

■成分・分量(6錠中)/メチルメチオニンスルホニウムクロリド150.0mg、水酸化マグネシウム100.0mg、炭酸水素ナトリウム900.0mg、沈降炭酸カルシウム1200.0mg、ロートエキス3倍散90.0mg(ロートエキスとして30.0mg)、ソウジュツ乾燥エキス50.0mg(ソウジュツとして500.0mg)、センブリ末30.0mg、ビオヂアスターゼ2000 24.0mg、リパーゼAP12 15.0mg

製造番号

使用期限

320錠

製造販売元
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Kowa

胃腸薬

新キャベジンコーワS

40錠 第2類医薬品

■効能・効果/胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重■用法・用量/成人(15歳以上)1回2錠、8歳以上15歳未満1回1錠、1日3回毎食後水又は温湯で服用してください。■注意/1.服用に際しては、添付文書をよく読んでください 2.高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください 3.小児の手の届かない所に保管してください 4.使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください■成分・分量(6錠中)/メチルメチオニンスルホニウムクロリド150.0mg、水酸化マグネシウム100.0mg、炭酸水素ナトリウム900.0mg、沈降炭酸カルシウム1200.0mg、ロートエキス3倍散90.0mg(ロートエキスとして30.0mg)、ソウジュツ乾燥エキス50.0mg(ソウジュツとして500.0mg)、センブリ末30.0mg、ビオヂアスターゼ2000 24.0mg、リパーゼAP12 15.0mg

開封年月日

製造番号

使用期限

X1205R E6K

製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14