One-side printing
Dimension: 100x200 (mm)

舒達胃乳

Alugel 衛部藥輸字第026402號

德國大藥廠
STADA

【成分】有效成分及含量：每公克含 Aluminium phosphate gel 20%..619 mg
每包含Aluminium phosphate gel 20%.. 12.38 g
其他成分(賦形劑)：Xanthan gum, Sodium benzoate, Disodium hydrogen phosphate, Liquid sorbitol, Milk flavor, Ethanol 96%, Purified water
單次劑量（20公克 / 1包）之酸中和能力為10mEq。

【用途(適應症)】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用
(一)曾因本藥成份引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:
(一)3歲以下
(二)消化道潰瘍的人
(三)腎衰竭的人(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師、藥師、藥劑生:
(一)孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)與其他藥品併用時。
四、其他使用上注意事項:
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

【用法用量】一天2至3次，一次一包或需要時服用

年齡	每次用量
12歲以上	每次20公克(1包)
6歲以上未滿12歲	每次10公克(1/2包)
3歲以上未滿6歲	每次5公克(1/4包)
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治

【警語】
一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師、藥師、藥劑生。

身體部位	副作用
腸胃道	便秘，噁心、嘔吐

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
(一)若有任何不適情況產生。
(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【儲存】請於30℃以下避光乾燥處儲存。
【包裝】4-200包鋁箔袋盒裝(每包20公克)
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠：STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD., BINH DUONG BRANCH
廠　址：No. 40 Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam
藥　商：韋淳貿易股份有限公司
地　址：台北市松江路65號4樓
電　話：(02)2500-6378
包裝廠：昱昇藥業有限公司桃園廠
廠　址：桃園市蘆竹區南山路一段436號