

<p><b>使用方法</b></p> <p>●若有配戴隱形眼鏡者, 使用前請務必先卸除隱形眼鏡●使用前請先將眼部周圍的彩妝、保養品或髒污清潔乾淨●洗眼杯使用前應先以乾淨的水充分洗淨, 使用完畢後亦須以乾淨的水充分洗淨●在不同的保存環境下, 水口周邊可能會附著紅色結晶物, 請以乾淨的紗布等輕輕拭除後即可使用●使用前, 請洗淨雙手</p>  <p>●將洗眼液倒入洗眼杯中, 至洗眼杯內側標示5mL刻度處。 請將洗眼杯貼近眼部周圍。</p> <p>●接著將洗眼杯按壓在眼部上方, 以此狀態將頭部後傾, 同時避免液體漏出, 臉部朝上, 請眨眼數次以進行洗眼。 *一邊眼睛使用過的液體, 請勿重複用於另一邊的眼睛。 *請勿洗眼30秒以上。 *液體顏色為維生素B12的顏色倘若沾染衣物時, 請盡快洗淨。</p>	<p><b>卸除隱形眼鏡後使用 アイボン 安睡 維生素洗眼液 mini</b></p> <p>日本製 不含防腐劑</p> <p>卸除隱形眼鏡後的眼睛, 依然存在許多髒污及蛋白</p> <p><b>可沖洗導致眼部不適之髒污</b></p> <p>添加兩種維生素(B6,B12)</p> <p>小林製藥 日本製 100mL</p> <p>10172037</p> <p>上列: 保存期限(西元年月日) 下列: 製造批號</p>	<p><b>緊密貼合型洗眼杯的特色</b></p> <p>能夠確實貼合面部・臉部朝上進行洗眼時液體不易外漏・眼部周圍不易感到疼痛 面部周圍不易留下痕跡</p>  <p>使用時將杯緣較低的一側貼近鼻側 5mL的容量 標線 使用時將杯緣較低的一側貼近鼻側</p> <p>●清洗沾附眼睛內的異物(請先卸妝再使用) ●從以不揉眼睛的方式, 清除灰塵、污垢時 ●擔心水質問題, 無法用自來水洗眼時</p> <p><b>■使用上注意事項</b> 1.有下列情形者請勿使用:曾因本藥成分引起過敏的人。2.有下列情形者, 請洽醫生診治:(1)青光眼的人。(2)正在接受醫師治療或其他眼藥的人。3.有下列情形者, 使用前請先諮詢醫師藥師藥劑師藥生:(1)曾發生藥物過敏症狀。(2)經醫師診斷為乾眼症的人。(3)強烈的眼部痙攣。■其他使用上注意事項1.為防止兒童誤食請妥善保管。2.避免陽光直射, 請置於陰涼處, 放入盒內, 存放於25°C以下。3.使用前, 請洗淨雙手。4.請依照藥品標示使用。5.以下情形, 請勿繼續使用。(1)超過保存期限。(2)開瓶28天後。(3)藥液混濁、變色或出現異物時。6.為避免污染藥品, 使用時請勿碰觸瓶口, 並避免與他人共用, 或以其他容器盛裝。7.洗眼杯請勿與他人共用。8.兒童使用時, 需有成年人旁協助指導。9.請勿在配戴隱形眼鏡之狀態下使用。於沖洗眼睛過後, 至少經過10-15分鐘左右再重新配戴。10.本品僅適用於沖洗眼睛, 禁止用於其他用途。11.洗眼液的顏色為維生素B12的顏色, 倘若沾染衣物時, 請盡快洗淨。■警語1. 使用本藥後, 若有發生以下症狀時, 請立即停止使用, 並接受醫師診治:(1)連續使用三天(或72小時)症狀沒有改善。(2)使用後產生眼睛劇痛、持續视力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。(3)若有任何不適狀況產生。</p> <p>JANコードアタリ 4987072042175</p>	<p><b>使用前請詳閱本說明書並妥善保存</b></p> <p>保存期限標示於產品包裝盒底部和容器下部 衛部藥輸字第026558號</p> <p><b>安睡 維生素洗眼液</b></p> <p>Eyewash 洗眼液</p> <p>使用含有粉紅色維生素配方的洗眼液, 沖洗灰塵和污垢所帶來之眼睛異物感、燥癢等不適, 讓眼睛清爽舒適。洗眼液接近淚液的滲透率, 低刺激。</p> <p><b>有效成分及含量(每1mL中)</b></p> <table border="1"> <tr><td>Dipotassium Glycyrrhizinate</td><td>0.25mg</td></tr> <tr><td>Chlorpheniramine Maleate</td><td>0.03mg</td></tr> <tr><td>Pyridoxine Hydrochloride</td><td>0.1mg</td></tr> <tr><td>Taurine</td><td>1mg</td></tr> <tr><td>Cyanocobalamin</td><td>0.01mg</td></tr> <tr><td>Sodium Chondroitin Sulfate</td><td>0.1mg</td></tr> <tr><td>其他成分(賦形劑)</td><td>Boric Acid, Sodium Borate, Polysorbate 80, Disodium Edetate Hydrate, Propylene Glycol, I-Menthol, di-Camphor, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide</td></tr> </table> <p><b>用 途(適 應 症)</b> 冲洗眼部。</p> <p><b>不 得 使 用 族 群</b> 曾因本藥成分引起過敏的人。</p> <p><b>用 法 / 用 量</b> 一天3至6次, 每次5mL。每次使用前, 將洗眼杯以乾淨的水充分洗淨, 避免污染洗眼杯的杯緣與杯內面。將杯子裝一次使用量且靠近欲洗淨的眼部, 歷緊以免液體流出, 將頭稍向後仰, 打開眼瞼且轉動眼球使洗眼液能夠充分溝洗到眼部, 在使用後用乾淨的水洗淨杯子。</p> <p><b>類 別</b> 藥師藥師藥劑生指示藥品 (諮詢專線) 0800-000-070 (週一至週日09:00-18:00)</p> <p><b>製造廠名稱及地址:</b> TOYAMA KOBAYASHI Pharmaceutical Co., Ltd. 100-1, Nakaoakubo, Toyama-shi, Toyama, Japan 電話: +81-76-468-2811</p> <p><b>產地:</b> 日本</p> <p><b>藥商名稱及地址:</b> 台灣小林藥業股份有限公司 台北市中正區衡陽路51號11樓之4 電話: (02) 2313-1227</p> <p><b>經銷商名稱及地址:</b> 統一藥品股份有限公司 台北市松山區東興路8號7樓</p> 	Dipotassium Glycyrrhizinate	0.25mg	Chlorpheniramine Maleate	0.03mg	Pyridoxine Hydrochloride	0.1mg	Taurine	1mg	Cyanocobalamin	0.01mg	Sodium Chondroitin Sulfate	0.1mg	其他成分(賦形劑)	Boric Acid, Sodium Borate, Polysorbate 80, Disodium Edetate Hydrate, Propylene Glycol, I-Menthol, di-Camphor, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.25mg																
Chlorpheniramine Maleate	0.03mg																
Pyridoxine Hydrochloride	0.1mg																
Taurine	1mg																
Cyanocobalamin	0.01mg																
Sodium Chondroitin Sulfate	0.1mg																
其他成分(賦形劑)	Boric Acid, Sodium Borate, Polysorbate 80, Disodium Edetate Hydrate, Propylene Glycol, I-Menthol, di-Camphor, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide																