

優麗舒[™]保濕型點眼液

Optive Fusion[™] Lubricant Eye Drops

衛部藥輸字第 026567 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

優麗舒保濕型點眼液(Optive Fusion[™] Lubricant Eye Drops)，可暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

【成分】有效成分及含量：
每 ml 含 Carboxymethylcellulose Sodium 5mg，Glycerin 9mg

其他成分(賦形劑)：
Sodium Hyaluronate, Erythritol, Boric Acid, Sodium Borate Decahydrate, Sodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Purite, Sodium Hydroxide / Hydrochloric Acid, Purified Water

【用途(適應症)】：
暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

【使用上注意事項】：

- 一. 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 三. 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射，宜保存陰涼之處。
 3. 使用前，請洗淨雙手。
 4. 請依照藥品標示使用。
 5. 請勿吞食本品。
 6. 使用後請緊閉瓶蓋。
 7. 為避免污染藥品或傷及眼睛，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 8. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - (1) 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 - (2) 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
 9. 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
 10. 使用本藥後可能出現短暫視力模糊的現象，而影響駕車或操作機械的能力。病人應等視力恢復清晰後再行駕車或操作機械。
 11. 下列副作用為本藥上市後自發性通報，無法確定其人數及發生頻率：
視覺異常
眼睛分泌物、眼睛癢、眼瞼水腫、眼睛有異物感、淚液增加、眼睛腫脹
免疫系統異常
過敏
- 四. 以下情形，請勿繼續使用：
 - (1) 超過保存期限的眼藥水。
 - (2) 瓶裝之眼藥水，開瓶 28 天(四週) 後。
 - (3) 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (4) 首次使用前，若本品之瓶口封條有損毀。

【用法用量】

一天 3 至 4 次	每次 1 至 2 滴
------------	------------

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【警語】：

一. 使用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 連續使用三天症狀沒有改善。
2. 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
3. 若有任何不適情況產生。
4. 產生過敏性反應。

【包裝】 100 毫升以下塑膠瓶裝。

【保存期限】：標示於外盒。

【儲存條件】：25°C 以下

修訂日期：2018 年 5 月

製造廠：Allergan Pharmaceuticals Ireland

製造廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland

藥商：台灣愛力根藥品股份有限公司

地址：台北市中正區羅斯福路二段 102 號 9 樓

電話：(02) 2366-9888



© 2018 Allergan, Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

