

150.0


**KAIGEN**

 衛部薬輸字第026856號  
 醫師藥師藥劑生指示藥品

 総合かぜ薬 **カイゲン顆粒**

 服用時，請務必詳閱本說明書。  
 請妥善保管以便必要時可閱讀。

# 改源和漢綜合感冒顆粒

## Kaigen Granule

**【本製品の優點】**

改源和漢綜合感冒顆粒の優點為採用生藥配方之顆粒劑，分解快速。  
 能有效舒緩各種感冒症狀（發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、喀痰、打噴嚏、畏寒、關節痛、肌肉酸痛）。  
 本藥為解熱鎮痛顆粒狀感冒藥。

**【成分】**

有效成分	一日含量 (3包/6g)	每公克含量	作用
Acetaminophen	900 mg	150 mg	解熱、緩解疼痛、頭痛、關節痛、肌肉酸痛等。
Noscapine	30 mg	5 mg	作用於咳嗽中樞的鎮咳劑。
dl-Methylephedrine Hydrochloride	30 mg	5 mg	擴張支氣管、鎮咳、舒緩喉嚨不適症狀。
Chlorpheniramine Maleate	7.5 mg	1.3 mg	緩解感冒初期的流鼻水、鼻塞、打噴嚏等過敏症狀。
Anhydrous Caffeine	75 mg	12.5 mg	緩解頭痛。
Powdered Glycyrrhiza (甘草末)	750 mg	125 mg	鎮咳、祛痰、幫助緩解感冒症狀。
Powdered Platycodon Root (桔梗末)	1,000 mg	166.7 mg	化痰、祛痰、幫助緩解感冒症狀。
Powdered Cinnamon Bark (桂皮末)	500 mg	83.3 mg	舒緩頭痛、解熱、幫助緩解感冒症狀。
其他成分(賦形劑)： Sucrose、l-Menthol、Clove Oil、Povidone、Powdered Acacia、Magnesium Aluminometasilicate。			

**【用途(適應症)】**

緩解各種感冒症狀（發燒、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、喀痰、打噴嚏、畏寒、關節痛、肌肉酸痛）。



260.0

品名	カイゲン顆粒	制作日	2017.7.26	MC	色調	スミ	アカB				トランプ
本コード		校	作業者印	AC	色調						( ) 角度
仮コード	0616S0705901	3校	岩城			朝日印刷株式会社	r55a5	APP.TB			

150.0



⚠【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用。
  - 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治。
  - 12歲以下。
  - 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  - 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
  - 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
  - 有心臟病及65歲以上的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
  - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
  - 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 其他使用上注意事項。
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。
  - 勿超過建議劑使用量。
  - 不要服用本藥超過七日。
  - 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen有急性肝衰竭的風險。
  - 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。
  - 儲存於室溫(25°C以下)避光處。

【用法・用量】 每次1包(2g)

12歲以上	每4-6小時一次，24小時不可超過三次
未滿12歲	請洽醫師診治

⊗【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
胃腸道	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- 若有任何不適情況產生。
- 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- 服用過量[每日Acetaminophen超過4,000毫克(mg)](相當於約13包)，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 6包~500包鋁箔袋盒裝(每包2公克)。

製造商：**カイゲンファーマ株式会社**  
 製造廠：Kaigen Pharma Co., Ltd. Nagano Factory  
 製造廠地址：大阪府河内長野市松ヶ丘中町1330-1  
 1330-1, Matsugaoka-Nakamachi, Kawachinagano, Osaka, JAPAN.  
 藥商：**大法貿易股份有限公司**  
 藥商地址：台北市忠孝東路四段107號8樓-1  
 藥商電話：(02)2763-7101

99999-1

品名	カイゲン顆粒	制作日	2017.7.26	MC	Ⓒ	色調	スミ	アカB					トランプ
本コード		校	3校	作業印	Ⓐ								( ) 角度
仮コード	0616S0705901				岩城		朝日印刷株式会社	r55a5	APP.TB				