

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40[®]プラス

第3類医薬品

製造番号
使用期限

この製品は
外面を透明フィルムで
ラッピングしています

第3類医薬品 【目の疲れ、目のかすみ】

サンテ40
プラス Sante 40 Plus

疲れ目に効く5つの成分配合。

B₆
ビタミン

E
天然型ビタミン

ネオスチグミン
メチル硫酸塩

B₅
プロビタミン

T
タウリン

ひと・すこやか
Santen 目薬

紙箱

キャップ: PP
中 栓: PE
ボトル: PET
外装フィルム: PP, PE



注

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 (1) 目の治療を受けている人、(2) 重たごにボアフル、ボアフル、ボアフル
 錠剤を受けている人、(3) 次の症状のある人は詳しい目の病が (4) 次の
 2. 使用に際しては、説明書をよくお読みください。
 3. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 4. ノット・コウカドレックスを装着したまま使用しないでください。

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

サンテ40
プラス 第3類医薬品
B₆ B₅ E T
ネオスチグミン 12mL

03

参天製薬株式会社「お客様相談窓口」
大阪府大阪市北区本森町4-20
電話 0120-127-023
(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
お問い合わせ先
お問い合わせ先
www.santen.co.jp
【副作用検査致謝制度の問い合わせ先】
電話 0120-149-831

ひとみ・すこやか
Santen
12mL

フィルムの上から
押してあげる

清涼感度
弱 → 強
液の色：無色透明

ビタミンなどの有効成分が疲れ目・かすみ目を改善!

- T B₅ B₆ 組織代謝を高める**
タウリン 1.0%、パンテノール 0.05%、ビタミンB₆ 0.05%
- E 血行を促進**
天然型ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール) 0.05%
- ネオスチグミン ビント調節機能を改善**
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%
- 炎症をしずめる**
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%
イブシロン-アミノカプロン酸 1.0%

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザル
コニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
d-ボルネオール、トメントール、等張化剤、pH調節剤

効能・効果 目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、
目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入っ
たときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による
眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼。

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

ひとみ・すこやか
Santen

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

ひとみ・すこやか
Santen

目の疲れ、目のかすみに **第3類医薬品**

サンテ40[®]プラス **目薬**

Sante 40 Plus

疲れ目に効く**5つ**の成分配合。

目の酷使や加齢によって、疲れやかすみ*といった目の症状があらわれやすく、
また回復しにくくなるといわれています。疲れやすくなった目は、ビタミンなど
栄養を与えてケアすることが大切です。

サンテ40プラスは、目の機能を活性化する栄養成分(ビタミン・アミノ酸)など
5つの成分が疲れ目やかすみ目に効果を発揮する目薬です。 *目やにの多いときなど

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談
ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売
者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間くらい使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでく
ださい(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染
または混濁することがあります)。また、混濁したも
のは使用しないでください。



効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感


成分・分量

成分	分量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
天然型ビタミンE (酢酸d- α -トコフェロール)	0.05%	末梢血管の血液の流れを良くします。
ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩)	0.05%	目の組織代謝を活発にします。
パンテノール	0.05%	目の組織代謝を活発にします。
タウリン	1.0%	目の組織代謝を活発にします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
イブシロン-アミノカブロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、d-ボルネオール、l-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。



(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

包装 12mL

(自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。)

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。

製造販売元 参天製薬株式会社
大阪市北区大深町4-20
www.santen.co.jp

商品およびアイケアに関する情報は <http://hitomi-sukoyaka.com>