

鈦諾莎[®]凝膠

Tyrosur[®] Gel

衛署藥輸字第024905號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【產品特性】

鈦諾莎[®]凝膠的成份(酪毛黴素, Tyrothricin)可用於革蘭氏陽性細菌(例如：鏈球菌、葡萄球菌)感染之預防及治療，可對於傷口的淨化作用及刺激皮膚形成粒狀新組織，而促使傷口癒合。

【成分】

有效成分及含量：每一公克凝膠含：Tyrothricin 1.0mg

其他成分(賦形劑)：Cetylpyridinium chloride, Propylene glycol, Ethanol 96%, Carbom 40000-60000(Synthalen K), Trometamol, Purified water

【用途(適應症)】

表淺性皮膚小傷口(不可使用於較大或較深的傷口)

【使用上注意事項】

- 一. 有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二. 有下列情形者，請洽醫師診治：
 1. 深部皮膚組織感染。
- 三. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四. 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 25°C以下貯存。
 4. 勿超過建議使用量。
 5. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
 6. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周與黏膜(包含鼻腔)。
 7. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
 8. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
 9. 長期使用有可能引起繼發性感染。

【用法用量】

一天2~3次，塗抹於患部。

【警語】

一. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染

二. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況發生。
2. 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】

100公克以下軟管盒裝。

【貯存】

25°C以下

【批號及保存期限】

印在外盒上及軟管下端接縫處。超過該期限請勿使用。

製造廠：Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
廠址：Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, Germany



康百佳實業有限公司
台北市 10352 南京西路76號6樓之3
www.compadre.tw
☎ 02-25566136

