Recto

9 mm

9 mm

11.5 mm

普拿疼 肌立 12小時鎮痛乳膠 Panadol Emulgel 12 Hours

gsk

請在使用本藥前仔細閱讀此仿單（說明書），因為本仿單（說明書）載有重要訊息。
- 請依本仿單（說明書）或醫師藥師建議使用本藥。
- 請妥善保管本仿單（說明書），以便隨時閱讀。
- 如需更多資訊與建議請諮詢藥師。

產品作用



短期使用以緩解肌肉關節酸痛、發炎腫脹、扭傷拉傷、運動傷害、肌腱炎（如媽媽手/網球肘）、關節炎引起的疼痛。

產品特性



有效止痛、消炎、減輕腫脹與解熱

本產品主成分為Diclofenac，為非類固醇抗發炎藥物(NSAID)的一種，其作用機轉為抑制前列腺素合成，能作用於肌肉及關節發炎的組織，可有效止痛、消炎(減輕發炎引起的腫脹)及解熱，改善病患活動能力。



含促進導入成分

本產品含促進導入成分Oleyl alcohol，經一個體外皮膚滲透力試驗發現，本藥之有效成分在24小時內滲透皮膚的累積含量，為未添加促進導入成分的Diclofenac diethylamine 1.16%乳膠的3倍。



緩解疼痛時間快一倍 加倍減輕疼痛感

在一踝關節扭傷的臨床研究(VOPO-P-307)中，使用普拿疼肌立12小時鎮痛乳膠，緩解疼痛的時間可比使用安慰劑的病人快一倍；同樣的治療時間下，降低的疼痛指數比使用安慰劑的病人多一倍。



12 小時長效鎮痛

普拿疼肌立12小時鎮痛乳膠經科學實驗發現，單次藥效可長達12小時，一天使用2次，輕鬆維持活力一整天。



乳膠質地，清爽不油膩

普拿疼肌立12小時鎮痛乳膠之質地清爽不油膩，不易沾黏衣服，且具舒緩及清涼作用。

成　分

有效成分及含量：每公克含 Diclofenac diethylamine 23.2 毫克，相當於 20 毫克之 Diclofenac sodium。
其他成分（賦形劑）：Butylhydroxytoluene, Carbomer, Cocoylcaprylocaprate, Diethylamine, Isopropyl alcohol, Liquid paraffin, Macrogolcetostearyl ether, Oleyl alcohol, Propylene glycol, Perfume eucalyptus sting, Purified water.
本藥成分屬於非類固醇消炎止痛藥成分(NSAIDs)。

Pharma code XXX

用途（適應症） 短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛

使用上注意事項

● 有下列情形者，請勿使用：
1. 懷孕期的最後三個月，因可能影響胎兒或增加生產過程之風險。
2. 曾因本藥成分引起過敏的人。
3. 曾對其他止痛、發燒或發炎藥品有過敏反應的人，例如 Aspirin（Acetylsalicylic acid 同時也具有抗凝血作用）、Ibuprofen。如不確定，請諮詢醫師或藥師。這些藥品過敏反應的症狀可能包括：氣喘、呼吸出現哮喘聲或呼吸困難、皮膚紅疹或蕁麻疹、臉或舌頭出現腫脹、流鼻涕。
4. 12 歲以下兒童。
● 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 已連續使用達 2 個星期。
2. 12 歲至 18 歲未成年患者，且已使用達 7 天。
3. 孕婦、計劃懷孕或可能懷孕婦女。懷孕期的前六個月應儘可能減少使用量與使用次數，以及縮短使用期間。
4. 哺乳婦女，不宜塗抹於乳房部位，亦不宜大面積或長期使用。
5. 已經在使用Diclofenac口服藥或其他非類固醇消炎止痛口服藥的人。
6. 疑似有皮膚感染的人切勿使用本藥。誤用本藥，可能會使病情惡化，並造成日後診斷及治療的困難。

72 mm

11.5 mm

297 mm

145 mm

Verso

9 mm

9 mm

11.5 mm

72 mm

Pharma code XXX

297 mm

11.5 mm

145 mm

● 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 有胃潰瘍或十二指腸潰瘍，或曾有相關病史的人。
2. 正在使用或近期曾使用任何定期服用的藥品，包括處方或不是經醫師處方之藥品的人。

● 其他使用上注意事項
1. 本藥僅供用於皮膚，不可用於口腔內亦不可口服，如不慎口服請立即就醫。使用後請洗手。
2. 勿超過建議使用量，且用藥時程愈短愈好。如果不小心使用多於建議量，請用紙巾抹去多餘的乳膠。
3. 本藥勿與眼睛及黏膜接觸。如不慎接觸，請立即用清水沖洗，若仍有不適情形請立即就醫。
4. 本藥不要塗抹於紅疹、皮疹或濕疹的皮膚，亦不要塗抹於裂開的皮膚、開放性傷口或任何不正常的皮膚。塗抹後如有出現皮疹，請停止使用。
5. 勿塗抹於大面積的皮膚。除非經醫師、藥師指示，勿使用超過2個星期。
6. 如果忘記於預定時間使用本藥，請依原來的使用量塗抹，切勿使用兩倍的使用量。
7. 使用前，如發現本藥有疑似變質或有包裝破損情形，或已過保存期限，請勿使用。
8. 使用完畢後，請將瓶蓋鎖緊，保存於陰涼之處，避免陽光直射，並置於小孩眼界未及、接觸不到的地方。
9. 本藥可用於非封閉性敷料，但不可用於密閉的封閉性敷料。
10. 本藥含丙二醇，可能會造成某些病患皮膚的局部輕微刺激。
11. 本藥含二丁基羥基甲苯，可能會引起局部皮膚反應(如:接觸性皮膚炎)或刺激眼睛及黏膜。

用法用量

本藥為醫師藥師藥劑生指示用藥，請依照醫師、藥師或藥劑生指示使用。

成人及 12 歲以上	普拿疼肌立12小時鎮痛乳膠緩解疼痛的效果可持續12小時， 每日2次，早上及晚上各1次。使用時，依據疼痛部位的面積大小來決定使用量，每次使用量約2-4克，塗抹面積建議在2公分x 2公分(約一個五元硬幣之寬度)至5公分x 5公分(約兩個十元硬幣之寬度)。在疼痛部位塗抹本藥後輕輕揉入皮膚。使用後，應即洗手，除非手部也是需要治療的部位。
12 歲以下	請勿使用

警　　語

● 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	**皮膚紅腫、發癢或刺痛或皮疹。(每100人，其中1-10人可能發生)** **皮膚會對光比較敏感，可能出現曬傷的症狀，包括發癢、紅腫及起水泡。(每1萬人，少於1人可能發生)**

● 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.使用七天內如症狀未改善或更惡化。
2.有不小心誤食的情形。
3.皮膚紅疹且出現水泡、蕁麻疹。(每1萬人，其中1-10人可能發生)
4.呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、氣喘或呼吸困難。(每1萬人，少於1人可能發生)
5.臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹。(每1萬人，少於1人可能發生)

包　　裝　1000 公克以下鋁質軟管裝。

儲存條件
儲存於 30°C 以下
衛部藥輸字第 026316 號

藥　　商
英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司
台北市忠孝西路一段 66 號 24 樓
諮詢專線：0800-212259

製 造 廠
GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz 1260 Nyon, Switzerland(瑞士)

二級包裝廠
新竹物流股份有限公司
新竹縣新豐鄉松柏村德昌街 228 號

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
©2019 GSK group of companies or its licensor.
TW 320410 – XXXXXXX