

RevAssure 病患諮詢檢查表

RevAssure 病患諮詢檢查表 - 用於開始 Revlimid® 治療的育齡期女性 (WCBP)

RevAssure 諮詢

- 告知對於未出生胎兒的潛在致畸胎風險
- 告知
 - 需於開始 Revlimid® 治療前 4 週、治療中斷期間、整個治療期間以及停止給藥後 4 週，使用 2 種有效避孕方法，或是
 - 選擇絕對且持續的禁慾
- 告知即使為閉經婦女仍必須遵循避孕的建議
- 告知懷孕的潛在不良後果，若有懷孕的可能性，需停止治療並立刻諮詢醫師
- 確認患者同意於開始治療前、治療期間每隔 4 週以及治療後 4 週，接受驗孕測試

避孕

高效避孕方法為：

- 子宮環 (IUD)
- 激素（注入激素、左炔諾孕酮釋放宮內系統 (IUS)、甲孕酮注射、孕激素單一抑制排卵藥物，例如 desogestrel）
- 輸卵管結紮
- 伴侶之輸精管切除術

有效方法：

- 男性保險套
- 子宮帽
- 子宮頸帽

由於多發性骨髓癌患者服用 Revlimid® 及 dexamethasone 會增加靜脈血栓性栓塞的風險，因此不建議與口服避孕藥併用。

給予 Revlimid® 病患的一般建議

- 告知使用 Revlimid® 的一般注意事項
- 告知患者不可將藥物分予他人，並繳回未用完之 Revlimid® 膠囊
- 告知服用 Revlimid® 時或停藥後 4 週內不可捐血

病患資料

- 給予 **RevAssure** 病患指南及 Revlimid® 仿單

重要！！

確認治療前 4 週，患者須開始 2 種有效避孕方法，或承諾全然且持續禁慾；且在 2 次驗孕測試為陰性之前，不可開始 Revlimid® 治療。

有關使用荷爾蒙避孕方法達到完全保護前所需的時間，請參考各荷爾蒙方法之仿單。

RevAssure 病患諮詢檢查表 - 用於開始 Revlimid® 治療的非育齡期女性

給予 Revlimid® 病患的一般建議

- 告知使用 Revlimid® 的一般注意事項
- 告知患者不可將藥物分予他人，並繳回未用完之 Revlimid® 膠囊
- 告知服用 Revlimid® 時或停藥後 4 週內不可捐血

判定無懷孕可能之婦女，須符合下列標準

女性病患或男性病患的女性伴侶，除非符合下列其中一項標準，否則均視同可能懷孕：

- 50 歲以上且自然停經 1 年以上*
- 經合格婦產科醫師確診為早發性卵巢衰竭
- 曾進行雙側輸卵管及卵巢切除或全子宮切除
- XY 基因型、透納氏症

*因癌症治療導致的停經，也視同可能懷孕

病患資料

- 給予 **RevAssure** 病患指南及 Revlimid® 仿單

RevAssure 病患諮詢檢查表 - 用於開始 Revlimid® 治療的男性病患

RevAssure 諮詢

- 告知若伴侶有懷孕的可能，於接受 Revlimid® 治療全程、劑量中斷期以及治療停止後 4 週，均需使用保險套

給予 Revlimid® 病患的一般建議

- 告知使用 Revlimid® 的一般注意事項
- 告知患者不可將藥物分予他人，並繳回未用完之 Revlimid® 膠囊
- 告知服用 Revlimid® 時或停藥後 4 週內不可捐血

病患資料

- 給予 **RevAssure** 病患指南及 Revlimid® 仿單