

藥品分三級 用藥看標示

處方藥：需經醫師開立處方使用

指示藥：醫師/藥師/藥劑生指示使用

成藥：可自行購買使用，使用前應
閱讀藥品說明書

牢記3要2不

要知風險

我國藥品分三級，包括處方藥、指示藥及成藥，藥品都有使用風險。

要問藥師

購買藥品時，應清楚表達自己的症狀並與藥師討論正確使用方法。

要看標示

使用藥品前要看清楚外盒或說明書上的用途、用法用量及注意事項。

不過量

不要自行調整藥量或使用次數，應依照說明書建議使用。

不輕忽

使用指示藥與成藥3天以上，症狀仍未改善，應儘速就醫。

藥物資訊

有效成分及含量：
Benzydamine HCL 1.5毫克/毫升

其他成分(賦形劑)：
Methyl Paraben、Glycerine、Purified Water

用途(適應症)：
緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍

用法用量：

成人及12歲以上兒童	噴液劑每次噴4-8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5-3小時使用一次。
不得使用族群	肝腎疾病患者 請洽醫師診治

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品
諮詢專線：0800-012-679
衛部藥製字第059039號



指導單位：衛生福利部食品藥物管理署、教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

廣告