

尺寸：14.8x21cm

喜療瘀[®]凝膠 Hirudoid[®] Gel

衛署藥輸字第025606號
<本品為醫師藥師藥劑生指示藥品>

[成分]

有效成分及含量：

每100公克的凝膠中含有300毫克的
Chondroitin polysulfate (Mucopolysaccharide
polysulfate)，相當於 25,000U。Chondroitin
polysulfate 來自牛的氣管軟管。

其他成分(賦形劑)：

Isopropyl alcohol, polyacrylic acid, propylene-
glycol, sodium hydroxide, purified water。

[用途(適應症)]

鈍物創傷後之血腫、淺層性靜脈炎之局部治療。

[使用上注意事項]

- 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分或本類藥品引起過敏的人。
- 有下列情形者，請洽醫師診治：
深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
孕婦、可能懷孕婦女、哺乳婦女。
- 其他使用上注意事項：
 - 不可將喜療瘀凝膠塗抹於傷口或受傷的皮膚。
 - 本藥應用於完整皮膚，並避免與眼睛及黏膜接觸。
 - 如同所有含酒精成分的凝膠一般，使用喜療瘀凝膠後不可以包紮。
 - 假若於電離子導藥療法，喜療瘀凝膠應由陰極導入。
 - 勿超過建議用量。
 - 塗抹皮膚外用藥後，應徹底洗淨雙手再戴隱形眼鏡。
 - 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。

[用法用量]

用法用量	使用療程	
依患部大小， 每天二至三次 ，一般而言， 擦上3至5公分 長之藥品即足 夠。	使用喜療瘀凝膠應持續至病況 緩解為止。	
	鈍物創傷的治療	持續10天以上
	淺層性靜脈炎	治療1-2週

[警語]

- 使用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應(如：紅、腫、起疹子)

- 使用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - 若有任何不適情況產生。
 - 持續治療兩週之後病情無法獲得改善，或停藥後再復發。

[包裝]

分14公克、40公克、100公克管裝。

[藥品的保存方式]

需儲存在低於30°C之環境下，請避免陽光直射，以防產品變質。為避免兒童誤食請放置於孩童不易拿到的地方。

製造廠：Möbilat Produktions GmbH

廠址：Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen/Ilm,
Germany

國外許可證持有者：Medinova AG

國外許可證持有者地址：Eggbühlstrasse 14, 8050
Zurich, Switzerland

藥商： DKSH 台灣大昌華藥股份有限公司

地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓

電話：(02) 8752-6666

諮詢專線：0800-020-580

