



"大裕"

消炎止痛

膜衣錠200毫克

Ibuprofen Tablets 200mg (Ibuprofen) "Daiyu"

非類固醇(Non Steroid) 消炎鎮痛解熱劑

“大裕”消炎止痛膜衣錠200毫克為非類固醇之消炎鎮痛劑。

【成分】每錠中含：

有效成分及含量：Ibuprofen 200 mg

其他成份(賦形劑)：Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Hydroxy Propyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose, PVP-K30, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, HPMC, Lemon Flavor, Propylene Glycol, New Coccine, Sunset Yellow FCF, Tartrazine, Titanium Dioxide

【用途(適應症)】

暫時性解除頭痛、肌肉疼痛、關節炎的輕度疼痛、牙痛、輕度疼痛及與感冒有關的疼痛、經痛及解熱作用。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 消化性潰瘍患者。
2. 嚴重血液異常的人。
3. 嚴重肝臟疾病的人。
4. 嚴重腎臟疾病的人。
5. 嚴重心臟疾病的人。
6. 對本劑過敏之患者。
7. 對阿斯匹靈 (Aspirin) 曾發生過敏反應的人 (症狀如呼吸困難、呼吸有咻咻聲、流汗、血壓下降、昏倒、意識不清、皮膚癢或起疹子等)。
8. 目前有在使用其他含本藥成分 (ibuprofen) 藥品的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 疑似感染的症狀
2. 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
3. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
4. 懷孕28週以上之婦女。
5. 過去或現在有血液檢查異常的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 12歲以下的兒童。
2. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
3. 曾發生消化性潰瘍的人。
4. 過去或現在有紅血球、白血球、血小板異常的人。
5. 支氣管氣喘的人。
6. 目前有服用阿斯匹靈 (Aspirin) 預防心臟病發作及中風的人。
7. 目前有使用其他消炎鎮痛藥品 (如Aspirin、非類固醇抗發炎藥、Acetaminophen等) 的人。
8. 每天喝三杯或更多之酒精性飲料的人 (因為與ibuprofen同時使用可能造成胃出血)。
9. 不清楚自己發炎或發燒程度該如何使用藥物的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 本藥只能暫時緩解發炎或疼痛的狀況，應該找出引起發炎或疼痛的原因並正確的治療。
2. 除非醫師指示，應避免長期使用同一類藥品。
3. 用於治療慢性疾病 (慢性風濕性關節炎) 時，應考量下列事項：
 - (1) 應定期作臨床檢查 (尿液檢查、血液檢查及肝功能檢查) 如發現檢查結果有異常現象，則須減量或停藥。
 - (2) 考慮採用非藥物性治療。
4. 高燒的幼兒、年紀較大或輕微發燒的慢性疾病 (包含肺結核、癌症等) 的人，應該要以最低有效劑量來小心使用本藥，並且要密切注意是否有副作用出現狀況。
5. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
6. 勿超過建議使用量。
7. 避免陽光直射。
8. 酒精警語：若您每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問您的醫師，您是否能服用ibuprofen或其他鎮痛解熱劑，因為ibuprofen可能造成胃出血。

【用法用量】

成人	症狀持續時，每4~6小時服用1錠。若服用1錠後，疼痛及發燒現象沒有改善，可服用2錠。但除非有醫師指示，24小時內勿服用超過6錠。須使用最小有效劑量。
兒童	除非有醫師指示或監護，12歲以下兒童不得使用本藥。

若服藥時有偶發性及中度心灼熱、胃不適或胃痛，可併服用食物或牛奶。若上述症狀的嚴重程度達中度以上或持續發生便須就醫。

【警語】：

一、服用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚癢、起疹子
感覺器官	視覺異常、重聽及耳鳴
肝臟	黃疸（症狀如眼白變黃、疲倦、沒食慾、小便呈現茶色或是大便變成灰白色等）及肝功能檢驗值異常
消化系統	食慾變差、噁心、嘔吐、胃痛、拉肚子、胃部（肚臍上方）不舒服、胃痛、口內炎、便秘等
精神神經系統	頭痛、暈眩、心情低落
其他	過度體溫下降

二、服用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1. 再生不良性貧血、顆粒球缺乏症、血小板減少。
- 2. 心灼熱、胃不適或胃痛等症狀的嚴重程度達中度以上或持續發生。
- 3. 發生嚴重過敏反應：STEVENS-JOHNSON 症候群（發熱、皮膚粘膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群）LYELL 症候群（中毒性表皮壞死症），發疹或誘發氣喘等症狀。
- 4. 使用本藥治療疼痛超過10天，且未改善。
- 5. 使用本藥治療發燒超過3天，且未改善。
- 6. 使用後，疼痛或發燒現象持續或惡化、發生新症狀、或疼痛部位紅腫。
- 7. 服用本藥過量：包含腹部疼痛、噁心、嘔吐、昏睡、昏沉。

【包裝】6~1,000錠，鋁箔盒裝、玻璃瓶裝。

【貯存方式】本品應置於緊密之容器中，於25℃以下貯存。

【藥理特性】（依文獻記載）

“大裕”消炎止痛膜衣錠200毫克之主要成份Ibuprofen是Phenylpropionic Acid的衍生物，係由英國Boots公司所開發的新非類固醇非比林系之抗發炎、鎮痛、解熱劑，可藉由阻斷前列腺素(Prostaglandin)的合成來產生效果。在臨床醫療效果顯現具作用時間長、吸收快，藥效迅速。口服製劑投與後，能在24小時內經由尿液排出，無蓄積滯留。亦不會產生習慣性，被廣泛應用於外科、齒科、婦科等各科各類領域，其主要的藥理特性如下：

- 一、臨床結果顯示，Ibuprofen之鎮痛和抗炎作用比Aspirin強2-8倍。而在動物實驗藥理活性上，Ibuprofen抗炎作用比Aspirin強16-32倍，解熱作用強20倍。
- 二、投與本劑後，60~120分鐘即可達到血中最高濃度。又 Ibuprofen 之蓄積性依存性之試驗結果顯示，本藥投與無成癮性及藥物蓄留之跡象。Ibuprofen 以無藥理活性代謝物之型式於24小時內經由尿液排除。藥物劑量至800mg血中濃度呈線性。
- 三、應用範圍廣泛：對各科、各種、各類炎症性疾患，及所併有之疼痛、發熱，以及感冒症候群均適用。
 - ◎ 針對兒童及成人組之試驗結果顯示，Ibuprofen對於止痛、發燒之治療效果較Acetaminophen強，二種藥物具有相同的安全性。
 - ◎ 針對有中度至嚴重偏頭痛症狀之成人試驗Ibuprofen 200mg和400mg可於2小時內降低疼痛至完全排除疼痛。
 - ◎ Ibuprofen 舒緩經痛之效果較Acetaminophen強（降低menstrual fluid PGF2a的程度比Acetaminophen高35%）。
 - ◎ 治療風濕性關節炎上，Ibuprofen在藥效與接受度上都與Aspirin一樣令人滿意。
 - ◎ Ibuprofen在分娩後會陰的止痛效果優於Acetaminophen，且無任何副作用。
 - ◎ Ibuprofen200-400mg對於治療一般頭痛之效果較Acetaminophen1000mg及Aspirin500-1000mg強。
 - ◎ 依據動物和人體之比較試驗證明Ibuprofen傷胃風險極低。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第052594號 GMP G-10928

【製造廠】衛達化學製藥股份有限公司	台中市南屯區工業區23路21號
【委託者】大裕生技興業有限公司	台中市西屯區府會園道179號19樓
【諮詢電話】0800 043899	