

淨脈舒® 持續性藥效錠

Viplant® retard S sustained release tablet

請您詳細閱讀此說明書。此說明書提供您重要的資訊，請小心正確地服用以得到最好的療效。
並請保留此說明書，需要時可再重新閱讀。

〔成份〕

有效成份及含量：每錠含有馬栗種子萃取物 (dry extract from horse chestnut seeds) 263.2mg，其中含 triterpene glycosides 50mg (calculated as anhydrous aescin)。

其他成份 (賦型劑)：Calcium hydrogen phosphate，Highly dispersed silicon dioxide，Eudragit RL 30 D，Eudragit RS 30 D，Triethyl citrate，Polysorbate 80，Povidone K-25，Crospovidone，Magnesium stearate，Hypromellose，Macrogol 4000，Iron(III)-oxide，Iron oxide hydrate，Titanium dioxide，Antifoam emulsion SE 2，Talc，Saccharin sodium，Vanillin flavor artificial。

〔用途 (適應症)〕

協助改善慢性靜脈功能不全引起之局部腫脹。

〔使用上注意事項〕

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 對馬栗種子萃取物或本品其他成分過敏者。
 2. 懷孕和哺乳婦女。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：如果腿部突然發生異常強烈的腫脹、膚色異常、緊繃或熱痛感，特別是單一腿有上述情形時，可能是嚴重疾病的症狀 (例如血塊引起的下肢靜脈栓塞)，應立即請教醫師。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：正在使用其他藥品者。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 本藥品有助於緩解慢性靜脈功能不全導致的不適感，例如疼痛、沉重、夜間抽筋、搔癢和浮腫等。
 2. 醫師囑咐的其他非侵入性輔助治療方法，例如腿部加壓、穿著彈性襪或浸泡於冷水中，亦都可以持續進行。
 3. 請務必遵照 (用法用量) 的指示方法服用，否則可能無法達到預期的療效。如有必要，請由醫師指示其他的用法用量。
 4. 服用本藥品時請勿咬碎，並與開水一起服用。
 5. 請放置於 25°C 以下陰涼處和孩童無法取得處。

〔用法用量〕

限成人使用。早、晚飯前各口服一錠。

〔警語〕

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止服用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

關係部位	症狀
皮膚	搔癢
消化系統	噁心、嘔吐、腹瀉、胃腸不適

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止服用，並接受醫師診治：嚴重的過敏反應。
- 三、療程長短會依症狀的嚴重程度而有所不同，可能需要長時間持續服用本藥品。若您發現症狀沒有改善或惡化，建議應立即請教醫師。

〔包裝〕

6~1000錠鋁箔盒裝



製造廠：Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
地 址：Willmar-Schwabe-Str. 4,
D-76227 Karlsruhe, Germany

藥 商：扶陞貿易有限公司
地 址：台北市松江路 101 號 6 樓之 1
電 話：0800-761-761