

藥物食品 安全週報



第 644 期

2018 年 1 月 19 日

發行人：吳秀梅 署長

【本期提要】

- 一、通訊交易 4 原則
- 二、血友病救命藥：
凝血因子製劑
- 三、遠離害命冰毒！



通訊交易 4 原則

農曆年節將至，業者紛紛推出各種年菜型錄。不論是用網路或型錄訂購各種食品，您知道該注意哪些規定嗎？有鑒於網路或型錄購物無法直接看到產品實體，消費者僅能參考業者提供的廣告圖片或宣傳文字作為選購依據；因此，衛生

福利部訂定「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，以維護消費者權益。

依據消費者保護法第 2 條第 1 項規定，「通訊交易」係指企業經營者以廣播、電視、電話、傳真、型錄、報紙、雜誌、網際網路、傳單或其他類似之方法，消費者於未能檢視商品或服務下而與企業經營者所訂立之契約。因此以通訊交易方式販售食品或提供餐飲服務之業者，應依法完整揭露相關資訊。另外消費者訂購食品時可把握「看」、「查」、「慎」、「取」4 原則：

- 1 看：睜大眼睛看內容：仔細詳閱商品之內容物、數量與淨重規格及企業經營者之食品業者登錄字號等資訊，避免落入圖片及文字陷阱。
- 2 查：手機平板查資訊：若無法於頁面揭露完整內容，可掃描業者提供之二維條碼（QR code）查詢更多資訊。
- 3 慎：謹慎思量再下單：下單前應留意訂購商品之種類、數量和價格，及商品交付期日與交付方式，並提供交付地點供消費者選擇。

通訊訂購食品
把握 4 原則

4 取：取貨檢查要當心：收到商品後應儘速檢查包裝是否完整，及內容物是否有短少或腐敗情形，若有瑕疵時應即時通知企業經營者。

食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）提醒，消費者購買前應審慎審閱定型化契約內容，如有發生消費爭議時，可撥打「1919」全國食品安全專線，或向各縣市政府消保官或衛生局洽詢協助。



血友病救命藥：凝血因子製劑

您是否曾聽過在歐洲王室肆虐的血友病（hemophilia）？這是一種血液無法凝固的疾病，血液凝固除了需要血小板外，凝血因子亦扮演重要的角色，人體中總計有 13 種凝血因子，缺少任一種凝血因子都會導致凝血功能異常，無法正常凝血，而 19 世紀英國的維多莉亞女王，就將致病基因遺傳給下一代，使得有近親聯姻習俗的歐洲皇室出現血友病，故又稱「王室病」。



臨床上將血友病分為 3 種類型，A 型血友病為缺乏第八凝血因子，約占血友病患 80~85%，B 型血友病缺乏第九凝血因子，約占血友病患 15~20%，而 C 型血友病則是缺乏第十一凝血因子，病患人數較少見且症狀輕微，屬於個體隱性遺傳。若血友病患缺乏適當的醫療照護，會經常性出血，造成病人的身心痛苦，以及家屬的照顧和醫療負擔。

由於血友病主要是凝血因子不足，因此補充患者缺乏的凝血因子成了重要的治療方式，例如：A 型血友病患以輸注第八凝血因子製劑為主，而 B 型血友病患以輸注第九凝血因子製劑為主。

目前用於治療之凝血因子製劑依其製程可分為兩類，其中一類由人類血漿分離濃縮製成（plasma-derived concentrates），另一類則以基因工程技術生產重組凝血因子（recombinant blood plasma factors），兩類凝血因子製劑皆須向食藥署申請查驗登記，取得許可證後才可上市。

此外，由人類血漿原料所製造者通稱為血液製劑，因所使用的血漿原料為人來源，為確保這類產品品質及安全，我國對於血液製劑採逐批放行之管理制度，與歐美先進國家一致。每一批血液製劑上市前，除需提供相關資料供食藥署審查外，食藥署也會派員實地檢查，針對產品運送及貯存的溫度狀況進行隨機抽樣，透過各式的檢驗確認其有效性及安全性後，核發「封緘證明書」，並於產品外盒加

貼「藥物檢查證」，才可販售供應醫院使用。食藥署每月也會在官網（首頁>業務專區>研究檢驗>生物藥品檢驗封緘）公告生物藥品檢驗放行品項及數量，提供各界下載查詢。



遠離害命冰毒！

俗稱「冰毒」的甲基安非他命遭濫用情況倍增！根據食藥署管制藥品濫用通報系統資料統計結果顯示，醫療院所通報的（甲基）安非他命濫用就診個案中，從2013年4,704人至2017年8,432人，就診人數增加1.8倍，顯示甲基安非他命濫用的現況日益嚴峻。



從外觀看來，甲基安非他命很像冰糖，又稱為「冰毒」，是醫療上禁止使用的藥物，被列為第二級毒品。其屬於中樞神經興奮劑，人體使用後，會產生生理及心理依賴，也會出現妄想型精神分裂症，其症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙等，也常伴有自殘、暴力攻擊行為等。要注意的是，甲基安非他命具抑制食慾的作用，常被不法人士摻入減肥藥中非法販賣，使用者在不知情的情況下吸食，不但觸法，更會成癮，傷害身體。

聯合國國際麻醉藥品管理委員會2016年報告指出，初次濫用藥物經常發生於青少年和年輕時期，有鑒於此，食藥署提醒，家長應多關心孩子的交友情形、學校課業壓力或適應上等問題，多花時間與孩子聊聊生活起居、傾聽心聲，適時給予正確的藥物濫用危害知識，才能拒絕同儕誘惑。

食藥署建議，年輕朋友們應多學習肯定自我、培養健康休閒活動、認識毒品對身體健康的傷害，並遠離是非場所，若想知道更多關於毒品濫用、危害、成癮戒治等相關資訊，可至食藥署「反毒資源館」網站（<http://consumer.fda.gov.tw/>）查詢，或撥打免付費專線 0800-770-885 諮詢。



朋友說中藥西藥可以同時吃，不會有問題，是真的嗎？

- 由於中西藥併用可能會引起交互作用，為了安全起見，建議中西藥不要合併使用。
- 無論中藥或西藥，用藥前務必請教醫師或藥師，最好是帶著處方箋諮詢，遵從醫師或藥師的囑咐用藥，如果未經指示而隨意服用，可能會引發其他副作用。
- 若要合併使用中西藥，建議至少要相隔2小時以上，並且向醫師或藥師確認服藥之順序。



行政院
Executive Yuan
行政院食品安全辦公室

衛生福利部
Ministry of Health and Welfare

行政院農委會
EXECUTIVE YUAN
MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERY AND FORESTRY

行政院消費者保護處
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION, EXECUTIVE YUAN

經濟部中小企業處
SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISE ADMINISTRATION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

FDA
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

廣告

刊名：藥物食品安全週報 (Food & Drug Consumer Newsletter)

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

電話：02-2787-8000

地址：臺北市南港區昆陽街 161-2 號

編輯委員：陳信誠、吳立雅、謝綺雯、劉淑芬、何淑惠、劉佳萍、邱文鏘、鄭維智、周珮如、林慧芬

林意筑、張連成、林孟昭、張家榮、廖家鼎、林澤揚、陳柏菁、姜寶仁、林宜蓉、呂昀儒

出版年月：2018 年 1 月 19 日

創刊年月：2005 年 9 月 22 日

刊期頻率：每週一次

GPN：4909405233

ISSN：1817-3691

本刊電子版登載於衛生福利部食品藥物管理署(<http://www.fda.gov.tw>)政府出版品及食品藥物消費者知識服務資訊網(<http://consumer.fda.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=310>)；或請至該網站訂閱電子報

