

藥品該如何儲存與丟棄？

應注意的事項	您應該注意的原因
藥品貯存	1. 藥品應放在乾燥陰涼及小孩不易拿到處，避免陽光直射。除非藥品（藥袋）有特別標示要冷藏，否則不必放冰箱。 2. 不要隨意以食品空罐分裝藥品，以免誤食。
使用期限	使用期限一般標示於藥品包裝，須在期限內使用完畢，或無包裝者，除藥袋有標示外，請依醫囑指示使用，未使用完之藥品不建議繼續留存。
過期藥品	藥品不可隨意丟棄，以免污染環境，請拿到醫療院所或住家附近的健保藥局回收箱回收處理。



您知道那些事項 是您用藥時該注意的呢？

為了維護您的身體健康，確保您的用藥安全，請您一定要了解藥品的正確使用方法。若有任何疑問，應請教您的主治醫師或藥師。

◎彰化基督教醫院藥物諮詢網站：

<http://pharm.cch.org.tw>

民衆專區可連結：

務必告知患者用藥資訊網、藥品外觀辨識查詢系統、處方用藥查詢系統、一般用藥須知、認識彰基藥袋…等。

◎彰化基督教醫院藥物諮詢室：

位於門診藥局旁，提供各式衛教單張及藥物諮詢服務。

參考資料：

安全用藥寶典 2006.

彰化基督教醫院 藥學部編製

用藥諮詢專線：(04) 7238595

轉3157(日)，3150(夜)

轉1155(兒童藥局)


網址：<http://pharm.cch.org.tw>

制定日期：2010年6月（第一版）

修訂日期：2011年9月（第二版）

編碼：6900-單張-中文-002-02

一般用藥須知



※本單張尚有英文、越南文、泰文、印尼文、簡體中文版本。



JCI國際認證



SINCE 1896

彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

藥學部

看病時該告知醫師那些事項？

該告知事項	您應該告知的原因
是否曾有藥品、食物或其他物質(如色素)過敏	藥品、食物或其他物質(如色素)有時本身或相互間可能有類似的過敏現象，應事先告知以避免可能會產生類似的過敏反應。
是否已懷孕或計劃懷孕	有些藥品會經由胎盤進入胎兒體內，而對胎兒造成危害。
是否哺乳或計劃哺乳	有些藥品會經由乳汁進入嬰兒體內，而對嬰兒造成危害。
是否有其他疾病而同時服用其他醫師開立的藥品、中藥或健康食品	藥品、中藥或健康食品可能會相互作用，而影響藥品的藥效，所以服藥前，務必告知醫師或藥師您正在服用的藥品、中藥或健康食品。
是否吸菸、喝酒	吸菸、喝酒都可能影響藥品的代謝進而影響藥效。
是否正在進行特殊的飲食計劃，如：低鹽、低糖	有些藥品內含鹽類、糖分，或某些液狀藥品內含酒精，可能會影響飲食計劃。



服藥中、後該遵守那些事項？

應遵守的事項	您應該遵守的原因
正確的服用藥品	不同的藥品有不同的使用方法，要確實遵照醫師或藥師指示服用，才可達到最佳藥效。
不要在黑暗中使用藥品	黑暗中視線不清，無法確認藥品，可能會誤食或服用過量藥品，而引起藥品不良反應或其他嚴重後果。
以白開水送服藥品	有些果汁（如葡萄柚汁）或飲料會與藥品相互作用，而影響藥效，甚至可能危及生命。
服藥時必須以足夠的水吞服並且不可躺著吃藥	沒有喝足夠的水或躺著吃藥，藥品停留在食道的時間會延長，容易造成藥品對食道的化學性灼傷。
配合醫囑完成療程	1. 某些藥品必須經過一段時間才能發揮顯著的藥效，若覺得效果不理想，應請教醫師，不可任意停藥。 2. 某些藥品有一定的療程才能完全發揮藥效，即使症狀已有改善或消失，也不可自行停藥，以免病情復發或惡化。
不可將藥品與他人分享	每個人病情狀況和對藥品的反應不盡相同，即使症狀相同也千萬不可將自己的藥品與他人分享。

用藥後出現藥品副作用該怎麼辦？

可能出現的狀況	您應該處理的方式
類似藥品副作用	任何藥品都可能有一定程度的副作用，但本單張所列的副作用不一定會發生在每位患者，除了極少數案例外，一般為短暫且可恢復的，若服藥後有任何不適，有可能是疾病本身所致，未必是藥品引起，所以用藥後出現新的症狀或徵象，請隨時與醫師或藥師聯絡。
誤食藥品或服藥過量	萬一不慎誤食藥品或服藥過量時，都可能對身體造成傷害，所以請帶著藥品迅速就醫。

