

使用之前請務必詳閱本說明書，並且妥善保管說明書，以備不時之需




醫師藥師藥劑生指示藥品  
衛署藥輸字第025431號

# 合利他命<sup>®</sup> 強效錠

## ALINAMIN EX PLUS<sup>®</sup>

維生素 B1 · B6 · B12 製劑



### 成份 有效成分及含量

成份	每錠含
Fursultiamine (維生素B1誘導體) (Fursultiamine Hydrochloride)	33.33 mg 36.39 mg
Pyridoxine Hydrochloride (維生素B6)	33.33 mg
Cyanocobalamin (維生素B12)	500 µg
Tocopherol Calcium Succinate (維生素E) (dl-α-Tocopherol Succinate)	34.53 mg 33.33 mg
Calcium Pantothenate (泛酸鈣)	10 mg
Gamma-Oryzanol (穀維素)	3.33 mg

### 其他成分 (賦形劑)

Light anhydrous silicic acid、Hydroxypropylcellulose、Low substituted hydroxypropylcellulose、Magnesium stearate、Microcrystalline cellulose、Calcium lactate hydrate、Hypromellose 2910、Erythritol、Riboflavin、Titanium oxide、Powdered acacia、Precipitated calcium carbonate、Talc、Sucrose。

### 用途 (適應症)

維生素B1、B6、B12、泛酸及維生素E缺乏症。

### ⚠ 使用注意事項

#### ● 有下列情形者，請勿使用

- 1) 未滿15歲者
- 2) 對本藥成分過敏者

#### 【警語】

(1) 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用並持此說明諮詢醫師藥師藥劑生。

受影響之身體部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢
消化器官	噁心、嘔吐、口腔發炎、胃部不適、軟便、下痢、便秘

(2) 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- 服用本藥品1個月而症狀仍未改善時。
- 生理期提前、經血量變多，生理期持續時間變長時，應停藥立即就醫。
- 軟便、下痢、便秘。

#### ● 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 正在使用其他藥品。

#### ● 其他使用上注意事項

- (1) 避免陽光直射，並保存於乾燥的陰涼處，請密封後妥善保管。
- (2) 請放置於小孩拿不到的地方。
- (3) 請勿改換至其他容器(以免被誤用或引起變質)
- (4) 裝在瓶子裡面的填充物，應於開瓶後丟棄(裝入填充物是為了避免錠劑於運送途中破損，開封後的填充物會有濕氣若再放回瓶中，會因為內含的濕氣而引起變質。)
- (5) 每次服用後務必捏緊瓶蓋(以免因吸濕而變質)。
- (6) 請勿服用超過使用期限的製品。
- (7) 請於外盒與藥瓶的「開瓶日期」記載欄，填寫開瓶日期。



### 用法·用量

餐後立即以水或溫水依下列用量服用，不需咬碎直接吞服即可。

年齡	1次用量	1日服用次數
15歲以上	2-3 錠	1次
未滿15歲	不可服用	



### 包裝

3-1000錠

製造廠(Plant) : Takeda Healthcare Products Company Limited

地址 : 2-21 Osadano-cho, Fukuchiyama, Kyoto 620-0853, Japan

製造廠(Office) : Takeda Consumer Healthcare Company Limited

地址 : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-0045, Japan

藥商 : 台灣武田藥品工業股份有限公司

地址 : 台北市南京東路3段217號7樓

電話 : (02) 2712 -1112