

斯斯解痛錠 退燒 止痛

スズレックス 頭痛 喉嚨痛 神經痛



斯斯解痛錠為膠囊型錠，不含阿斯匹靈，不刺激胃。緩解頭痛、牙痛、神經痛、月經痛、肌肉酸痛。感冒所引起的發燒、畏寒、頭痛、喉嚨痛，也可有效緩解。

【成分】每錠中含有：

有效成分及含量：**Acetaminophen 500 mg、Caffeine anhydrous 30 mg**

其他成分(賦形劑)：Pregelatinized Starch、Croscarmellose Sodium、Stearic acid

【用途(適應症)】

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 12歲以下。

2. 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3. 有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

2. 同時服用含acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量。

4. 服用過量的acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含acetaminophen成分的藥品，但是每天服用acetaminophen超過4000毫克(相當於本藥8錠)會發生肝臟損害。

5. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen有急性肝衰竭的風險。

6. 避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每次1~2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次
6歲以上未滿12歲	每次1/2~1錠
3歲以上未滿6歲	每次1/4~1/2錠

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。

2. 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

3. 服用過量[每日超過acetaminophen 4000毫克(相當於本藥8錠)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

4. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】2-1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝，2-1000包鋁箔袋盒裝(每包1錠)。

【儲存】25°C以下。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第037944號
GMP優良藥品G-4350號



木一ユ一株式会社 商標授權
五洲製藥股份有限公司
通過PIC/S GMP優良藥廠
桃園市新屋區赤欄里17-1號

I25
v5.00