衛生福利部食品藥物管理署104年度建置民眾用藥安全知識網計畫

上推手沙宣導講座

が

一点

一点<br

(講師所屬機構單位)例:正確用藥教育資源中心____醫院、社區用藥諮詢站_____藥局等

講師:

時間:

地點:





正確用藥五大核心

能力一 做身體的主人

能力二 清楚表達自己的身體狀況


能力三 看清楚藥品標示

能力四 清楚用藥方法、時間

能力五 與醫師、藥師做朋友



能力一做身體的主人





認識感息

感冒原因:大部分為病毒引起



- 常見症狀:鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、發燒、頭痛、 疲倦。
- 成人建議多休息多喝水和補充電解質,感冒通常會自行痊癒,必要時可使用藥品緩解不適的症狀。
- 感冒不一定要用抗生素,濫用易造成抗藥性,除非併發細菌性感染,才需在醫師診斷處方之下使用抗生素。

認識感冒藥

市售綜合感冒藥... 含多種成分,包括:

- 1. 止痛退燒: Acetaminophen
- 2. 抗組織胺(治療流鼻水): Chlorpheniramine, Diphenhydramine
- 3. 解鼻充血劑(治療鼻塞):Pseudoephedrine, Methylephedrine
- 4. 止咳: Dextromethorphan, Glycyrrhiza extract
- 5. 化痰: Guaifenesin
- 6. 其他:咖啡因、維他命



使用綜合感冒藥

應該要知道...

- 作用:一般只能緩解症狀,不能預防感冒或殺死病毒。
- 什麼時候應就醫:
 - 嚴重症狀,發燒且有其他症狀,例如:吃不下東西、喘不過氣或發抖
 - 有濃痰(黃鼻涕)·胸痛或咳嗽有血
 - 服藥後3天症狀沒有改善或更不舒服時

使用綜合感冒藥

應該要知道...





- 每個人的症狀不同,所需劑量也不同,應依醫師、藥師指 示使用適量的感冒藥
- 過量可能會增加副作用
- 部分綜合感冒藥會造成嗜睡,駕駛或操作機械需注意
- 避免併用多種感冒藥,併服其他藥品應諮詢醫師、藥師
- 自己的感冒藥不提供他人使用,也不亂推薦

有獎徵答時間



能力二 清楚表達自己的身體狀況





看病或到藥局購買藥品時向

醫師或藥師

- 1. 有哪些不舒服的症狀,從什麼時候開始?
- 2. 有沒有對藥品或食物過敏,有 喝酒或特殊飲食習慣
- 3. 有沒有其他疾病
 - 例如: 心血管、陽胃道、肝臟、腎臟或家族遺傳疾病




看病或到藥局購買藥品時向醫師或藥師或藥師 說清楚:

- 4. 目前正在使用的藥品
 - 一 包括: 西藥、中草藥、成藥及保健食品等
- 5. 是否從事開車或操作機械等需要專心的工作
- 6. 女性需告知是否懷孕、正準備 懷孕或正在哺餵母乳
- 7. 同時看兩科以上門診,應主動告知醫師,避免重複用藥



有獎徵答時間



購買綜合感冒藥 時,不用告知藥 師我有糖尿病和 有吃糖尿病的藥?

或



能力三 看清楚藥品標示





使用綜合感冒藥前,應清楚下列事項:

- 1. 服藥前應遵循醫師,或藥師指示或參考藥品說明書, 包括服藥時間、每次劑量與服用方法。
- 2. 藥品標示的用途是否與自己的症狀相符
- 3. 藥品的外觀形狀、顏色等,是否與外盒、藥品說明 書描述的一樣,包裝是否完整。
- 4. 看清楚外盒、藥品說明書上寫的注意事項,可能的 副作用或警語。

5. 保存期限和方法:請檢視藥品是否已 過期、變質或變色。綜合感冒藥一般 建議保存於陰涼處,避免太陽直射, 也不可以放在浴室、廚房等濕熱的地 方。



6. 外包裝有沒有「政府核准字號」,如有疑慮請諮詢藥師, 亦可自行上衛生福利部食品藥物管理署網站,「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢系統」查詢。

藥品包裝 (背面)

不含類固醇 阿斯匹靈

感冒膠囊

感冒膠囊是非比林系的綜合

感冒藥,有感冒前兆、流鼻水、

疲勞、酸痛、精神不振,請早服 用以免導致二次感冒,如症狀消

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流

鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽)。

大人(15歲以上)一次二粒,8歲

以上,未滿15歳一次一粒,一天

失,勿長期使用易致成瘾。

[適應症]

[用法・用量]

二次飯後服用。





名稱外觀

藥品適應症

成分

政府核准字號

用法用量



充 分 休 息 有 效 制 伏 感 冒

感冒時,最令人困擾的是:睡前因為種種症狀感到不適,影響睡眠品質而無法充分休息,造成精神不濟,不 但影響正常生活作息,也影響身體更快恢復健康!

正常的生活作自由

主成分	每錠中含	主要作用	
Acetaminophen	500 mg	不刺激胃且有效之解熱鎮痛劑。 可緩解頭痛、肌肉酸痛。	
Pseudoephedrine Hydrochloride	30 mg	具收縮鼻黏膜血管、抑制充血、鼻腔腫脹功效。 能緩解鼻塞,促進鼻道暢通並恢復自由舒適的呼吸。	
Chlorpheniramine Maleate	2mg	可緩解流鼻水、打噴嚏等不舒服症狀。	

【適應症】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)。

【用法用量】

一日3至4次。成人每次1錠。12歲以上適用成人劑量;6歲以上未滿12歲,每次1/2錠;6歲以下之兒童,請洽醫師診治,不宜自行使用。

藥品仿單 (說明書)

成分

藥品適應症

用法用量

【注意事項】

- 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2. 避冤陽光直射,宜保存於陰涼之處。
- 3. 除非有醫師藥師藥劑生指示,請注意下列事項:
- (1) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。(2) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 4. 勿超過建議劑量。
- 5. 若有不適情況產生,應立即停藥就醫。
- 6. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

- 1. 服用後,若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉朧疼痛、心跳加速、排尿 困難、視覺模糊等症狀,應停藥立即就醫。
- 2. 除非有醫師藥師藥劑生指示,請遵循下列情況服用:
 - (1) 6歲以下不建議自行使用。
 - (2) 曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 3. 若咳嗽持續達一星期以上,或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛,應停藥立即就醫。
- 4. 吸煙、慢性阻塞性肺疾,如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者,請勿自 行使用本藥。
- 5. 不要服用超過建議劑量,因高劑量會產生焦慮、量眩或失眠,兒童可能會產生躁動。
- 6. 不要服用本藥超過七日。
- 7. 服用本藥後,如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日,應停藥立即就醫。
- 8. 服用本藥後,如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐,應停藥立即就醫。
- 9. 酒精警語:若每日喝三杯或更多之酒精性飲料,請詢問醫師是否能服用本藥,因為Acetaminophen可能造成肝損害。
- 10.本藥含抗組織胺類成分,應注意下列事項:
 - (1) 服用本藥後,可能引起嗜睡現象,駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料,亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
 - (2)除非有醫師藥師藥劑生指示,下列病患請勿服用本藥:青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 11. 本藥含Pseudoephedrine Hydrochloride,應注意下列事項:
 - (1)除非有醫師藥師藥劑生指示,有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
 - (2) 服用Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 期間,或停用MAOI 兩星期内,不得服用本藥,如不了解服用之藥物是否含有MAOI,請詢問醫師或藥師。
 - (3) 服用任何含有本藥主成分 Pseudoephedrine 之過敏、氣喘、咳嗽、感冒治療劑、解除鼻充血劑時,不要服用本藥。

【包裝】

6~28錠PTP鋁箔盒裝。

【貯存】

30°C以下,密封乾燥貯存

- 緊師藥師藥劑生指示藥品
- 衛署藥輸字第025297號





台北市忠孝西路一段66號24樓

Australia Pty Ltd.

製造廠址/82 Hughes Avenue, Ermington NSW 2115 Australia


藥品仿單 (說明書)

注意事項、 副作用或警語

保存方法

政府核准字號

有獎徵答時間



服用綜合感冒藥 前,要看清楚藥 品用途、使用方 法、注意事項?

或



能力四清楚用藥方法、時間



常見的用藥錯誤觀念

- 綜合感冒熱飲:熱熱喝、快快好。
- 部份綜合感冒藥分日、 夜間錠,使用日錠真的 不會有嗜睡的副作用嗎? 夜錠的效果是否真的不 會影響到隔天?

使用方法 將一包伏冒熱飲倒入一般杯子或馬克杯中。慢慢加入半杯溫開水,攪拌均匀後再依個人喜好加入冷水或溫水至約150c.c.(一般紙杯之八分滿)。立即服用,熱熱的喝,效果更佳。

主要成份	8	毎包	每公克
Acetam		500mg	100mg
Phenyl	hrine Hydrochloride	8.30mg	1.66mg
Ascort	c Acid	33.35mg	6.67mg

内容量 50

- · 請於室溫乾燥及孩童拿不到之處
- · 才 第密封包如有破損,請勿使用並混回藥商
- · 爲·亦藥師藥劑生指示藥品

將一包____熱飲倒入杯中。 慢慢加入半杯溫開水,攪拌 均勻後,再依個人喜好加入 冷水或溫水至約150c.c.(一 般紙杯的八分滿),立即服用

用藥時,清楚用藥方法、時間

按醫師或藥師指示並依外包裝、藥品說明書(仿單)標示的時間、劑量服用...

- 錠劑、膠囊,以適量溫開水服用。
- 避免與葡萄柚汁、牛奶、茶、果汁、咖啡、酒等飲料搭配服用。
- 綜合感冒糖漿不是一次服用整瓶, 需依指示劑量使用。



用藥時,清楚用藥方法、時間

注意事項...

- 藥品應放置於兒童不易取得之處,避免兒童誤服
- 6歲以下兒童建議就醫,不建議家長自行購買給兒童 使用。
- **-** 感冒藥水應依正確用法、用量使用
- 忘記服藥時是否需要補服,應洽詢醫師或藥師
- 服藥後有過敏反應,立即停藥就醫
- ※ 過敏症狀:皮膚紅疹、嘴唇或眼皮水腫、呼吸困難等



用藥時,清楚用藥方法、時間

注意事項...

- 含有咖啡因或治療鼻塞成分的綜合感冒藥,可能導致精神亢奮、睡不著。
- 因咖啡因具成癮性,服用綜合感冒藥時不可併用咖啡、茶葉等含咖啡因的飲品,避免咖啡因過量。
- 部分綜合感冒藥含有抗組織胺成分(治療流鼻水、過敏),可能會導致嗜睡。如需從事開車或操作機械等工作者須小心服用,並注意不可併用安眠藥、鎮靜劑等藥品。




有獎徵答時間



能力五與醫師、藥師做朋友






遵守五个原則

- 不買來路不明的藥品,遵守「不聽、不信、不買、 不吃、不推薦」五不原則。
- 用藥問題可以直接請教醫師或藥師
- 向醫師或藥師說明自身症狀及目前使用的藥品,確 實依照指示服用
- 綜合感冒藥可能與其他藥品有交互作用,一起吃會 影響藥效,因此諮詢醫師或藥師是最好的辦法



有獎徵答時間



有用藥問題時,可以撥打藥局或藥袋上電話諮詢藥師?



正確用藥五大核心記得了嗎?

能力一 做身體的主人

能力二 清楚表達自己的身體狀況

能力三 看清楚藥品標示

能力四 清楚用藥方法、時間

能力五 與醫師、藥師做朋友

