



# 正確使用 胃藥


## (制酸劑)

### 五要原則

#### 1 要知風險



要知道長期使用制酸劑（胃藥）會造成胃酸不足、影響營養吸收，導致胃腸細菌過度生長而增加感染等風險。含碳酸氫鈉的制酸劑，可能會造成腹脹；含鋁的制酸劑，可能會造成便秘；含鎂的制酸劑，可能會造成腹瀉。



#### 2 要看標示

制酸劑



要看藥品的藥盒或仿單（說明書）的使用方法及注意事項，並按藥袋、仿單（說明書）或藥盒的指示服用藥品。

#### 3 要告病況



要告知醫師，是否曾對藥品過敏、是否有胃腸潰瘍、高血壓、腎臟疾病、骨質疏鬆、失智等疾病，及是否有同時併用其他藥品。

#### 4 要遵醫囑



要依照醫師、藥師所給予的相關指示用藥。

#### 5 要問藥師



服用制酸劑（胃藥）後，如有任何不適症狀（例如過敏），或服用制酸劑3天後腸胃不適的症狀未改善，請與您的醫師、藥師聯絡並儘快就醫。



指導單位：衛生福利部食品藥物管理署、教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

協辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會、社團法人臺灣臨床藥學會

