

鬬雞富力康親水性乳膏

Douji Fulikang cream

【作用】

本劑為水溶性乳膏，其主要成分 Econazole Nitrate，用來治療皮膚菌、黴菌及革蘭氏陽性菌等所引起的皮膚病及發炎。Triamcinolone Acetonide 則具有抗發炎、抗過敏、抑制搔癢等作用，此兩種成分之藥量比例可各自發揮效用，而不會相互產生抑制作用。

【藥效特性】

1. Econazole Nitrate 具有廣效性抗黴菌活性，專門治療由皮膚菌群(Dermatophytes)，酵母菌群(Yeasts)及黴菌群(Moulds)等所引起的黴菌感染。另外對 G(+) 細菌亦有抗菌效果。Econazole Nitrate 主要是藉著破壞細胞膜而發揮抗黴菌作用。
2. Triamcinolone Acetonide 是自然產生的一種更有效的腎上腺皮質激素，其抗發炎機制還不清楚，但有些證據顯示，在人類的療效與其血管收縮強度具有相關性。

【成分】

有效成分及含量：每公克含：Econazole Nitrate(10 mg)、Triamcinolone Acetonide(1 mg)

其他成分(賦形劑)：

Cetostearyl Alcohol、Sorbitan Monostearate(Span60)、Sodium Bisulfite、Disodium Edetate Hydrate、Dimethicone、l-Menthol、Polysorbate 60(Tween 60)、Propylene Glycol、White Petrolatum、Liquid Paraffin、Musk(Synthetic)、Water Purified.

【用途(適應症)】

治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 1. 皮膚結核、梅毒或病毒感染的人(如疱疹、牛痘、水痘)。
 2. 對藥品各成分過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

兒童、孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 塗抹本藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
 4. 黴菌治療至少二星期，使用本藥須完成全程療效。
 5. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 6. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
 7. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
 8. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 9. 本藥請勿使用於施打活性或活性減毒疫苗的打針部位。
 10. 本藥限於皮膚外用，不得內服，或使用於眼睛內，

亦不得施於眼睛四周或黏膜。

11. 本藥避免使用在大面積(大於使用者兩個手掌的面積)或皮膚深層感染的地方。
12. 塗抹皮膚外用藥後請勿蓋住該部位，以免增加副作用。
13. 類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

【用法用量】取本劑適量塗擦於患部，不超過一天 2 次，早晚各塗敷 1 次。



【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

關係部位	症狀
皮膚和局部性	局部刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎。紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

- 服用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 1. 使用後自覺狀況未改善或更惡化時。
 2. 治療一星期症狀未改善時，或症狀有改善但停藥後又病情復發時。
 3. 超過建議劑量，有副作用產生，應立即停藥並就醫。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】1000 公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

【儲存】25℃ 以下儲存。

PIC/S GMP 優良藥品

委託者：佰億園企業有限公司

地 址：臺中市臺灣大道四段 328 號

製造廠：光南製藥廠股份有限公司宜蘭廠

地 址：宜蘭市黎明二路 240 號