



滴露消毒藥水
Dettol Liquid

衛署藥輸字第022322號

【成分】

有效成分及含量：

Chloroxylenol 4.8% w/v

其他成分（賦形劑）：Water Softened,
Isopropyl Alcohol, Pine Oil, Castor Oil,
Caustic Soda Solution, Caramel

【用途（適應症）】殺菌、消毒。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用
曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，請洽醫師診治
9個月以下
3. 其他使用上注意事項
(1)為防止兒童誤食，請妥善保管。
(2)避免陽光直射。
(3)本藥僅供外用，不可口服，如不小心喝入，可能會產生短暫嘔吐以及腹瀉，建議喝下減輕刺激的飲料（如：牛奶），若不適病狀仍持續，應立即就醫。
(4)本藥應稀釋後使用，否則有可能刺激眼睛、皮膚和黏膜，如不小心濺到眼睛，應以大量冷水沖洗。

【用法用量】

醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用）
具體使用方式，請參照右邊表格。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
有任何不適情況發生。

【用法用量】醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用）。

個人衛生	不適用於治療濕疹，未經稀釋不宜使用。
	洗澡：如用浴缸沐浴，可在水中加入 0.5-1 瓶蓋。除經醫師指示外， 9 個月以下嬰兒不宜使用。
	暗瘡、粉刺： 0.5 瓶蓋與 400 毫升水混合，每日輕敷患處。
	防止頭皮屑： 0.5 瓶蓋與 800 毫升溫水混合，先浸濕頭髮，再用乾毛巾包裹頭髮 10 分鐘，然後如常洗髮。
家居清潔	衣服消毒：將 1.5 瓶蓋與 2.5 公升水混合，用以浸泡衣物、抹布、餐巾、手帕等。
	洗抹地板、家居表面：將 1.5 瓶蓋與 2.5 公升水混合。
	消毒廁所、水盆、排水口、廢物箱：不須稀釋。
醫療	未經稀釋不宜使用。
	產婦用途： 0.5 瓶蓋與 800 毫升溫水混合，清洗陰部，消毒防菌。
	輕度割傷、擦傷、蚊蟲咬傷： 0.5 瓶蓋與 400 毫升水混合，清洗傷口，然後用乾紗布或繃帶包紮。

【包裝】**4000**毫升下塑膠瓶裝
保存於30°C以下



滴露消毒藥水
Dettol Liquid

衛署藥輸字第022322號

【成分】

有效成分及含量：**Chloroxynol 4.8% w/v**

其他成分（賦形劑）：Water Softened, Isopropyl Alcohol, Pine Oil, Castor Oil, Caustic Soda Solution, Caramel

【用途（適應症）】殺菌、消毒。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，請洽醫師診治

9個月以下

3. 其他使用上注意事項

(1) 為防止兒童誤食，請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 本藥僅供外用，不可口服，如不小心喝入，可能會產生短暫嘔吐以及腹瀉，建議喝下減輕刺激的飲料（如：牛奶），若不適病狀仍持續，應立即就醫。

(4) 本藥應稀釋後使用，否則有可能刺激眼睛、皮膚和黏膜，如不小心濺到眼睛，應以大量冷水沖洗。

【用法用量】

醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用），具體使用方式，請參照右邊表格。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

有任何不適情況發生。

【用法用量】

醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用）。

個人衛生	不適用於治療濕疹，未經稀釋不宜使用。
	洗澡：如用浴缸沐浴，可在水中加入1-2瓶蓋。除經醫師指示外，9個月以下嬰兒不宜使用。
	暗瘡、粉刺：1瓶蓋與400毫升水混合，每日輕敷患處。
	防止頭皮屑：1瓶蓋與800毫升溫水混合，先浸濕頭髮，再用乾毛巾包裹頭髮10分鐘，然後如常洗髮。
家居清潔	衣服消毒：將3瓶蓋與2.5公升水混合，用以浸泡衣物、抹布、餐巾、手帕等。
	洗抹地板、家居表面：將3瓶蓋與2.5公升水混合。
	消毒廁所、水盆、排水口、廢物箱：不須稀釋。
醫療	未經稀釋不宜使用。
	產婦用途：1瓶蓋與800毫升溫水混合，清洗陰部，消毒防菌。
	輕度割傷、擦傷、蚊蟲咬傷：1瓶蓋與400毫升水混合，清洗傷口，然後用乾紗布或繃帶包紮。

【包裝】750毫升下塑膠瓶裝
保存於30℃以下



滴露消毒藥水
衛署藥輸字第022322號

【成分】

有效成分及含量：Chloroxylenol 4.8% w/v

其他成分（賦形劑）：Water Softened, Isopropyl Alcohol,

Pine Oil, Castor Oil, Caustic Soda Solution, Caramel

【用途（適應症）】殺菌、消毒。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，請洽醫師診治

9個月以下

3. 其他使用上注意事項

(1) 為防止兒童誤食，請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 本藥僅供外用，不可口服，如不小心喝入，可能會產生短暫嘔吐以及腹瀉，建議喝下減輕刺激的飲料（如：牛奶），若不適病狀仍持續，應立即就醫。

(4) 本藥應稀釋後使用，否則有可能刺激眼睛、皮膚和黏膜，如不小心濺到眼睛，應以大量冷水沖洗。

【用法用量】

醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用），具體使用方式，請參照右邊表格。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用

，並接受醫師診治：

有任何不適情況發生。

【用法用量】

醫師藥師藥劑師指示藥品（稀釋後使用）。

個人衛生	不適用於治療濕疹，未經稀釋不宜使用。
	洗澡：如用浴缸沐浴，可在水中加入2-4瓶蓋。除經醫師指示外，9個月以下嬰兒不宜使用。
	暗瘡、粉刺：2瓶蓋與400毫升水混合，每日輕敷患處。
家居清潔	防止頭皮屑：2瓶蓋與800毫升溫水混合，先浸濕頭髮，再用乾毛巾包裹頭髮10分鐘，然後如常洗髮。
	衣服消毒：將6瓶蓋與2.5公升水混合，用以浸泡衣物、抹布、餐巾、手帕等。
	洗抹地板、家居表面：將6瓶蓋與2.5公升水混合。
醫療	消毒廁所、水盆、排水口、廢物箱：不須稀釋。
	未經稀釋不宜使用。
	產婦用途：2瓶蓋與800毫升溫水混合，清洗陰部，消毒防菌。
包裝	輕度割傷、擦傷、蚊蟲咬傷：2瓶蓋與400毫升水混合，清洗傷口，然後用乾紗布或繃帶包紮。
	【包裝】125毫升下塑膠瓶裝
	保存於30℃以下