

# 青少年用藥 小百科

## 奇癢無比

## 的疥瘡

感謝奇美柳營醫院藥學部提供



疥瘡，俗稱「癩」，為「疥蟲」感染而引起的傳染性皮膚病。疥蟲寄生於人體皮膚表面，約只有針尖大小(成蟲的大小約為0.3 mm)，肉眼幾乎看不到，很容易傳染給他人。成蟲寄生在人體皮膚的角質層，寄生時，會挖掘疥隧道(長度為1-10mm)，且在此留下卵和糞便而引起過敏反應造成皮膚的劇癢。



◎疥蟲於顯微鏡下的樣子

◎疥蟲於皮下寄生所挖掘的疥隧道

### 傳染方式

經由“接觸”傳染。接觸患者的皮膚、衣物、床舖或傢俱或從事性交行為皆可能被傳染。疥瘡傳染性很高，患者應格外注重個人清潔衛生。

### 潛伏期

1. 第一次感染：平均約2-6星期才會出現症狀。
2. 二次感染：症狀約1-4天就會出現症狀。


### 症狀

1. 粟粒大小小丘疹	2. 劇癢	3. 疥隧道
尖頂可見小水疱或小膿疱，患處極之狼瘡	尤其是晚上就寢後或熱水浴後	疥蟲於皮下寄生所挖掘，在此留下卵和糞便

### 好發部位

侵入皮膚皺褶及柔軟處：

指縫、腕關節、肘關節屈側、腋下、肚臍周圍、臀部，女性的乳房特別是乳頭，男性外陰部及其周圍皮膚特別是陰囊、包皮、龜頭。



### 藥物治療：

中文名稱	息疥軟膏	悠力素洗劑
英文名稱	Scabi cream	Ulex lotion
外觀		
使用方法	<p>將藥品薄薄且均勻地塗抹於全身自頸部以下之皮膚。請確定患者的手指或腳趾縫隙、指甲縫、下腹部、臍部、皮膚皺褶處皆有確實地塗抹上藥膏。</p> <p>塗抹藥物前，請先將身體完全洗淨並擦乾</p> <p>息疥：靜待8-12小時後(正確時間請依醫囑)將全身完全洗淨。</p> <p>悠力素：24小時後(正確時間請依醫囑)再塗抹第二次。塗抹第二次後須再等48小時方可全身洗淨</p>	

# 青少年用藥 小百科

## 奇癢無比

## 的疥瘡

感謝奇美柳營醫院藥學部提供



副作用及建議處置	1. 痙攣或頭昏眼花→請和您的醫生聯絡 2. 持續出現皮膚刺激、發紅或皮膚疹→主動告知醫師或及早回診	1. 持續發生皮膚刺激或起疹子→請和您的醫生聯絡
懷孕分級	C	C
哺乳	不宜使用	不明確
新生兒	不宜使用	可以使用
幼兒 (1-3歲)	不宜使用	可以使用
注意事項	1. 外用藥品，請勿內服。 2. 未經醫師指示，請勿過度使用藥物。 3. 本藥膏應避開口、鼻及眼睛處塗抹；若不慎碰觸至眼睛，則應持續以清水沖洗2-3分鐘。	

### 護理照護：

1. 貼身衣物、床單、被單先用熱水(60°C以上)燙10分鐘或煮沸或電熨斗燙過後，再清洗。
2. 棉被或無法燙的衣物可靜置兩週勿穿、勿用，待疥蟲自然死亡。
3. 傢俱、環境可用消毒劑清潔。
4. 發病期間不可與他人混用床單、毛巾、內衣褲。
5. 患者與接觸者(尤其是親密接觸者)都必需皆受治療。
6. 發病期間不到公共場所(如旅館、飯店、值班室)過夜，或洗三溫暖。