



槐枝 (Sophorae Japonicae Ramulus)

【來源】本品為豆科 (Leguminosae) 植物槐 *Sophora japonica* L.的乾燥枝。

【性狀】本品呈圓柱形，呈段狀，常有分枝，表面灰綠褐色，具多數突起橫向皮孔及縱皺紋。質堅硬，斷面表皮成黃綠色，木質部呈淡黃白色，氣微香。

【誤用品】

一、柳枝

【來源】本品為楊柳科 (Salicaceae) 植物柳 *Salix babylonica* L.的乾燥嫩枝。

【性狀】本品呈圓柱形呈段狀，常有分枝，表面棕褐色，光滑，偶見皮孔，於節處有芽痕。質堅硬，斷面表皮棕色，木部類白色，氣無。

二、黃花槐枝

【來源】本品為豆科 (Leguminosae) 植物黃花槐 *Sophora tomentosa* L.的乾燥嫩枝。

【性狀】本品呈圓柱形，呈段狀。表面灰黑色，密佈疣狀突起物。有分枝之殘跡。質堅硬，斷面表皮呈灰棕色，其內類白色，中心為粉棕褐色約，氣微。

三、槐角

【來源】本品為豆科 (Leguminosae)，植物槐 *Sophora japonica* L.的乾燥果實。

【性狀】本品莢果圓柱形，有時彎曲，不開裂，於種子間縊縮呈念珠狀，長 3-6cm，直徑 0.6-1cm，易在縊縮處折斷，表面黃綠色或黃棕色，有光澤，皺縮而粗糙，一側邊緣(背縫線)有黃色帶，頂端有突起的殘留柱基，基部常有果柄殘留。每果實有種子 1-6 枚，種子扁橢圓形，長 8-10mm，寬 5-8mm，棕黑色，表面光滑，一側有下凹的灰白色種臍，橢圓形，質堅硬，子葉兩片，黃綠色，果肉黃綠色，肉質柔軟而黏，呈半透明角質狀，乾後皺縮，氣微弱，味微苦。



【正品】：槐枝藥材



【誤用品一】：柳枝藥材



【誤用品二】：黃花槐枝藥材



【誤用品三】：槐角藥材