



蒲公英 (Taraxaci Herba)

一、蒲公英

【來源】本品為菊科 (Compositae) 植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. 或其他同屬植物的乾燥帶根全草。

【性狀】本品皺縮捲曲團狀，主根紡錘形，彎曲，外側著生支根和鬚根，長 10-20 cm，徑 0.5-2 cm，表面灰棕色，有深縱溝及皺紋，斷面平坦，根頭部有棕或黃白色毛茸，或已脫落。葉皺縮成團，或成卷曲條片，外表綠褐色或暗灰綠色，葉背主脈明顯，先端尖或鈍，邊緣淺裂或羽狀分裂，基部漸狹呈柄狀，頭狀花序頂生，黃褐或淡黃白色。花莖極細，冠毛黃白色外露。氣微，味微苦。

二、台灣蒲公英

【來源】本品為菊科 (Compositae) 植物台灣蒲公英 *Taraxacum formosanum* Kitamura 的乾燥帶根全草。

【性狀】主根長圓柱形、粗大，斷面具乳汁。葉叢生於根際，排列成蓮座狀，具葉柄。葉片呈狹披針形，倒向羽狀深裂，葉緣具規則之齒裂，葉頂裂片三角戟狀。花梗由根莖先端長出，頭狀花序，單一，頂生，花黃色，全為五齒裂緣的舌狀花。總苞杯狀二層，頂端成丁字型分叉；外苞片線狀披針形 14 枚，內苞片 3 枚。瘦果紡錘形，長 3mm，黃褐色，具 5 大肋，10 小肋。果之上方具有瘤狀突起，果頂具長 7mm 之喙，冠毛白色，約 6mm。

【誤用品】

一、兔兒菜

【來源】本品為菊科 (Compositae) 植物兔兒菜 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai 的乾燥帶根全草。

【性狀】主根長紡錘形，細而微彎，鬚根多數。斷面具乳汁。根生葉大而叢生，莖生葉小而互生。葉片披針形，葉全緣或疏鋸齒緣。花為疏聚散狀圓錐花序，黃色，舌狀花。總苞狹鐘形二層；外苞片卵形 5 枚，內苞片長橢圓狀線形 8 枚。瘦果披針形，長 3.5mm，黃褐色，具大小相等之 10 肋。果頂之喙長 1.5mm，冠毛白色，約 4mm。

二、紫背草

【來源】本品為菊科 (Compositae) 植物紫背草 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的乾燥帶根全草。

【性狀】根細長圓柱形具鬚根，莖直立，細長圓柱形，稍分枝。斷面無乳汁。葉互生羽狀全裂，下葉片呈披針形，葉基抱莖，葉緣淺裂，粗鋸齒緣。莖葉背常呈紫紅色。疏繖房狀花序，具長梗，其管狀花呈淡紫紅色。總苞筒狀有苞片 8 枚。瘦果為狹矩圓柱形，長 3mm，黃褐色，具 5 大肋。果頂無長喙，冠毛白色，約 8mm。

三、刀傷草

【來源】本品為菊科 (Compositae) 植物刀傷草 *Ixeris laevigata* (Blume) Schultz-Bip. ex Maxim. var. *oldhami* (Maxim.) Kitamura 的乾燥帶根全草。

【性狀】根細小多分歧，莖單生或群生。斷面具乳汁。根生葉呈披針形，羽狀淺裂，具小尖齒，葉柄具有 1-3mm 之鬚毛。莖生葉數枚。頭狀花序呈繖房狀排列，黃色，舌狀花。總苞圓筒狀，外苞片卵狀披針形，6 枚；內苞片線狀披針形，8 枚。瘦果披針形，長 3mm，黃褐色，具 10 肋。果頂之喙長 1mm，冠毛污黃白色，約 3mm。







【正品】：台灣蒲公英藥材



【誤用品一】：兔兒菜藥材



【誤用品二】：紫背草藥材



【誤用品三】：刀傷草藥材