



三支雨傘標

咳精散

本處方是參考日本配方調配之方劑，其藥理作用明確，療效巧妙交互相乘，鎮咳祛痰效果迅速，配方清涼芳香，具止癢、潤喉爽聲，在建議使用劑量下，服用安全，本『三支雨傘標咳精散』為綜合鎮咳祛痰治療劑。

成分

有效成分及含量：Each Gram Contains:

Guaifenesin 100.0 mg
Noscaphine 15.0 mg
Caffeine 30.0 mg
dl-chlorpheniramine maleate 2.0 mg
dl-Methylephedrine hydrochloride..10.0 mg

其他成分（賦形劑）：MENTHOL, ASPARTAME, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, LACTOSE, D-BORNEOL, HPMC615, SILICON DIOXIDE AD102, ALUMIUM SILICATE, GLYCYRRHIZIN

用途（適應症）

咳嗽、喀痰

使用上注意事項：

1. 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 苯酮尿症（Phenylketonuria）患者，因本品含阿斯巴甜（ASPARTAME）。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 12歲以下。
 - (2) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 - (3) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
 - (4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 - (5) 有心臟病及 65 歲以上的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

- (2) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

4. 其他使用上注意事項：

- (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2) 避免陽光直射。
- (3) 勿超過建議劑使用量。
- (4) 不要服用本藥超過七日。
- (5) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (6) 不得與酒精性飲料併用。
- (7) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

用法用量

成人及 15 歲以上	一日 3~4 次，每次 1 公克（約一匙量），以溫開水服用。
12 歲以上未滿 15 歲	適用成人劑量 2/3。
12 歲以下	請洽醫師診治。

警語：

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、 排尿困難、視覺模糊

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (1) 若有任何不適情況產生。
 - (2) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
 - (3) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
 - (4) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包裝】6-1,000公克玻璃瓶裝

【儲藏】儲存於25℃以下。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第043792號GMP G-7108

【製造廠】衛達化學製藥股份有限公司

台中市工業區23路21號

【委託者】大裕生技興業有限公司

台中市西屯區府會園道179號19F

藥理藥效作用

Guaifenesin 具祛痰作用，能有效減少並液化支氣管分泌物的濃稠黏液，促進呼吸道內部濃痰排出，兼可舒緩咽喉乾燥，減輕乾咳與頻繁的咳嗽。

Noscapine能抑制延腦咳嗽中樞，反射咳嗽反射，有效治療惱人的咳嗽，並具有支氣管擴張作用，給藥後10~15分呈效，且持續數小時，為最佳之鎮咳劑。

Caffeine主要作用在大腦皮質及延髓，服用後由於大腦皮質興奮致使思想力、理智、精神及肌肉等活動能力增加，並可減低倦睡及疲勞，配合此藥能減輕疲倦提振精神，增加感覺知性，對患者甚有幫助。

dl-chlorpheniramine Maleate為一抗組織胺劑，可有效緩解因感冒，過敏與喉嚨刺激引起之咳嗽，其療效甚佳。

dl-Methylephedrine Hydrochloride 具有擴張支氣管功能，鬆弛氣管緊張並抑制咳嗽。

咳嗽是因為喉嚨、氣管、支氣管受到刺激而引起的，此刺激是指身體對不當的異物和分泌物，試圖排出體外的作用，因此，咳嗽可說是保護身體的自衛反應。引起咳嗽的原因可分為體內和體外：

- (一) 外界的影響：如香煙、灰塵、冷空氣、乾燥的空氣、空氣污染、化學藥品，誤吞食物等都可能引起咳嗽的現象。
- (二) 體內的刺激：喉、鼻、氣管、支氣管、肺發炎、分泌物的壓迫等。

咳嗽和痰，往往被聯想在一起，但是並不一定有痰就有咳嗽，有咳嗽就有痰，咳嗽可分為二種，一是沒有痰的咳嗽，又稱為乾咳，另一種是有痰的咳嗽，又稱為濕咳。常見的空氣污染，帶來上呼吸道不適之咳嗽及四季感冒伴隨支氣管炎，引起積痰咳；而化學氣味、花粉等引起過敏性誘發噴嚏、咳嗽；吸煙亦會引起喉癢、乾咳以及老年人抵抗力較弱，容易引起痰飲等老人咳，這些都是誘發因素之一，以目前醫藥科技的進步，新藥方劑不斷被研發，根本治療當可控制得宜。