

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	皮膚紅、皮膚癢、發疹等過敏症狀。

二、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 有任何不適情況產生。
- (二) 腹瀉持續不止或更嚴重。
- (三) 有血便及自發性腸道出血狀況。
- (四) 使用一星期後無效。

【類 別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包 裝】2-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存條件】25℃以下，避免陽光直射。

4

委託者：



製造廠：



PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>

5

成分：每錠含
Sennosides.....20mg
(as sennoside A·B...12mg)
適應症：緩解便秘
衛署藥製字第037697號
G.M.P. G-0695



委託者：
興中美生技有限公司
台北市內湖區基湖路35巷6號5F
製造廠：
PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號
<http://www.chungmei.com.tw>
諮詢專線：04-7524166

中美
便通樂®
膜衣錠 (番瀉葉苷)



用法用量：
成人及12歲以上，一日1次，
1次1~2錠，於睡前（或空腹
時）服用；6歲以上未滿12
歲，適用成人使用量之1/2；
3歲以上未滿6歲，適用成人
使用量之1/4；未滿3歲之嬰
幼兒，請洽醫生診治。初次
應使用最小劑量，再視通便
情況增減用量。
醫師藥師藥劑生指示藥品。
注意：請詳閱說明書後使用

[BOT]
製造批號：
保存期限：



使用說明書請由此打開

2017.01.

中美便通樂® 膜衣錠 (番瀉葉苷)

THROUGH® F.C. Tablets "C.M." (Sennosides)

【藥理特性】

衛署藥製字第037697號 G.M.P. G-0695

1. 本藥是參考美國藥品典籍PDR及日本藥局方之處方，經本公司研發團隊設計配方，以科學化之製藥技術、CGMP最高品質要求標準，研製而成，外加膜衣，於晚上睡前服用後可發揮排便效果。
2. 本藥品採用天然草本植物Senna(番瀉葉)萃取，主要有效成分為Sennoside A及B合劑，其作用機轉為投與後，於胃及小腸並未吸收，而是以原形到達大腸作用部位，經腸內細菌作用後生成代謝產物Rhein anthrone直接刺激大腸壁而促進大腸蠕動，才具有排便、緩下作用。
3. 便秘是指排便時間比一般正常的時間慢，而且糞便時常滯留於大腸及盲腸時間長，便秘並不會構成生命危險。在排除便秘因素為腸病變引起之外，便秘常見原因有壓力、藥物、飲食習慣、作息、缺乏運動、肥胖、妊娠(懷孕)、老年人胃腸蠕動功能低下....等，針對各不同因素作適度調適改善，再配合服用本藥，效果更佳。Sennosides被發現可緩解便秘，可藉由促進調節排泄功能而幫助便秘患者復原。

1

【成分】每錠含

有效成分及含量：Sennosides.....20mg
(as sennoside A B.....12mg)

其他成分(賦形劑)：Lactose Hydrous、Sodium Lauryl Sulfate、
Polyvinyl Pyrrolidone、Carboxymethylcellulose Calcium、
Talc、Glyceryl Behenate、Sepifilm 3024、Sepifilm 752

【用途(適應症)】緩解便秘。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(二) 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：(一) 3歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 連續使用一星期以上。

(三) 併用其他瀉劑。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

2

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。

(五) 本藥使用期間可能會有腹瀉發生。

(六) 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

(七) Senna類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

【用法用量】

成人及12歲以上	一日1次，1次1~2錠，於睡前（或空腹時）服用
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之1/2
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之1/4
未滿3歲之嬰幼兒	請洽醫生診治
初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。	

3