

食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(三)

修正草案總說明

為加強食品中殘留農藥之管理，並依據食品衛生管理法第二十五條規定：「食品衛生檢驗之方法，由中央主管機關公告指定之。」爰修正「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(三)」，其修正要點如下：

- 一、增列「表三、歐殺松等四十九項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數(正離子模式)」及「表四、 α -蟲必死等六十五項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數」。
- 二、增修定部分文字。

食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(三)

修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
1. 適用範圍：本檢驗方法適用於<u>蔬果類</u>、<u>穀類</u>、<u>乾豆類</u>、<u>茶類</u>、<u>香辛植物及其他草本植物</u>等食品中 114 項農藥多重殘留分析。 2.2. 試藥：丙酮採用殘留量級；正己烷、乙酸乙酯及氯化鈉均採用化學試藥特級；<u>去離子水(比電阻於 25℃可達 18 MΩ·cm 以上)</u>。農藥對照用標準品阿特寧 (aldrin) 等 114 項 (品項見表一及表二)。 2.5.1.1. <u>蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)</u>： 取均質後之檢體約 18 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35℃ 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，<u>混合均勻</u>，<u>注入液/液</u>萃取匣，靜置 10 分鐘。以乙酸乙	1. 適用範圍：本檢驗方法適用於<u>蔬菜</u>、<u>水果</u>、<u>穀類</u>、<u>乾豆類</u>、<u>茶類</u>及<u>食用花卉</u>等食品中 114 項農藥多重殘留分析。 2.2. 試藥：丙酮採用殘留量級；正己烷、乙酸乙酯及氯化鈉均採化學試藥特級。農藥對照用標準品阿特寧 (aldrin) 等 114 項 (品項見表一及表二)。 2.5.1.1. <u>蔬菜、水果及食用花卉 (鮮食)</u>： 取均質後之檢體約 18 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35℃ 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，<u>混勻後</u>注入液/液萃取匣，靜置 10 分鐘。以乙酸乙酯 80	一、增列「表三、歐殺松等四十九項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數(正離子模式)」及「表四、α-蟲必死等六十五項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數」。 二、增修定部分文字。

酯 80 mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3~5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液 (I) 1 mL 以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 2.5.1.2. 穀類及乾豆類： 取磨粉後之檢體約 9 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加<u>去離子水</u> 18 mL，靜置 20 分鐘，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，<u>混合均勻</u>，注入液/液萃取匣，靜置 10 分鐘。以乙酸乙酯 80 mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3~5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液	mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3~5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液 (I) 1 mL 以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 2.5.1.2. 穀類及乾豆類： 取磨粉後之檢體約 9 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加水 18 mL，靜置 20 分鐘，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，混勻後注入液/液萃取匣，靜置 10 分鐘。以乙酸乙酯 80 mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3~5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液 (I) 1 mL	
--	---	--

(I) 1 mL 以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 2.5.1.3. <u>茶類、香辛植物及其他草本植物</u> (乾燥)： 取磨粉後之檢體約 2 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加<u>去離子水</u> 18 mL，靜置 20 分鐘，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，<u>混合均勻</u>，<u>注入液/液萃取匣</u>，靜置 10 分鐘。以乙酸乙酯 80 mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3 ~ 5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液 (I) 1 mL 以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 附註： 1. 本檢驗方法除<u>茶類、香辛植物及其他草本植物</u>(乾燥)外，	以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 2.5.1.3. <u>茶類及食用花卉</u> (乾燥)： 取磨粉後之檢體約 2 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加水 18 mL，靜置 20 分鐘，加入丙酮 70 mL，振搖萃取 3 分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以丙酮 30 mL 重複萃取 1 次，過濾後合併濾液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至無丙酮。將 20% 氯化鈉溶液 2 mL 加入濃縮液中，<u>混勻後</u>注入液/液萃取匣，靜置 10 分鐘。以乙酸乙酯 80 mL 分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液/液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約 3 ~ 5 mL，收集沖提液，於 35°C 以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以丙酮溶解並定容至 5 mL (V)，供作檢液 (I)。取檢液 (I) 1 mL 以氮氣吹乾，以正己烷 1 mL 溶解，供淨化用。 附註： 1. 本檢驗方法除<u>茶類及食用花卉</u> (乾燥)外，其檢出限量	
---	---	--

其檢出限量如表一及表二；<u>茶類、香辛植物及其他草本植物</u> (乾燥)之檢出限量則為表列數值之 5 倍。 4. 以氣相層析質譜儀 (GC/MS)、氣相層析串聯質譜儀 (GC/MS/MS) 或液相層析串聯質譜儀 (LC/MS/MS) 進行檢測時，應進行方法確效。<u>GC/MS/MS、LC/MS/MS 之多重反應偵測 (multiple reaction monitoring, MRM) 模式參考參數如表三及表四。</u> 表一、以 GC/FPD (P)檢測農藥之檢出限量 (51 項) 註：<u>茶類、香辛植物及其他草本植物</u>(乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。 表二、以 GC/ECD 檢測農藥之檢出限量 (63 項) 註：<u>茶類、香辛植物及其他草本植物</u>(乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。 <u>表三、歐殺松等 49 項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數 (正離子模</u>	如表一及表二；<u>茶類及食用花卉</u> (乾燥)之檢出限量則為表列數值之 5 倍。 4. 以氣相層析質譜儀 (GC/MS)、氣相層析串聯質譜儀 (GC/MS/MS) 或液相層析串聯質譜儀 (LC/MS/MS) 進行檢測時，應進行方法確效。 表一、以 GC/FPD (P)檢測農藥之檢出限量 (51 項) 註：<u>茶類及食用花卉</u> (乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。 表二、以 GC/ECD 檢測農藥之檢出限量 (63 項) 註：<u>茶類及食用花卉</u> (乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。	
---	--	--

<u>式)</u> (詳如修正草案)。		
<u>表四、α-蟲必死等 65 項農藥</u> <u>之氣相層析串聯質譜儀多重</u> <u>反應偵測模式參數</u> (詳如修正 草案)。		

表一、以 GC/FPD (P)檢測農藥之檢出限量（51 項）

農藥		檢出限 量(ppm)	農藥		檢出限 量(ppm)
英文名	中文名		英文名	中文名	
Acephate	歐殺松	0.05	Mephosfolan	美福松	0.02
Azinphos-methyl	谷速松	0.05	Methacrifos	---	0.02
Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.03	Methamidophos	達馬松	0.02
Bromophos-methyl	甲基溴磷松	0.03	Methidathion	滅大松	0.02
Carbophenothion	加芬松	0.02	Mevinphos	美文松	0.02
Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	Monocrotophos	亞素靈	0.02
Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.03	Omethoate	歐滅松	0.05
Cyanofenphos	施力松	0.02	Parathion-ethyl	巴拉松	0.01
Demeton-s-methyl	滅賜松	0.03	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.01
Diazinon	大利松	0.02	Phenthoate	賽達松	0.02
Dichlorvos	二氯松	0.01	Phorate	福瑞松	0.01
Dimethoate	大滅松	0.01	Phosalone	裕必松	0.03
Disulfoton	二硫松	0.01	Phosmet	益滅松	0.02
Ditalimfos	普得松	0.03	Phosphamidon	福賜米松	0.05
EPN	一品松	0.01	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松	0.01
Ethion	愛殺松	0.01	Pirimiphos-methyl	甲基亞特松	0.01
Ethoprophos	普伏松	0.01	Prothiofos	普硫松	0.01
Fenamiphos	芬滅松	0.01	Pyraclofos	白克松	0.03
Fenitrothion	撲滅松	0.01	Pyrazophos	白粉松	0.05
Fensulfothion	繁福松	0.05	Quinalphos	拜裕松	0.02
Fenthion	芬殺松	0.02	Salithion	殺力松	0.02
Fonofos	大福松	0.02	Terbufos	托福松	0.01
Formothion	福木松	0.03	Triazophos	三落松	0.02
Iprobenfos	丙基喜樂松	0.03	Trichlorfon	三氯松	0.05
Isoxathion	加福松	0.02	Vamidothion	繁米松	0.05
Malathion	馬拉松	0.01			

註：茶類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。

表二、以 GC/ECD 檢測農藥之檢出限量（63 項）

農藥		檢出限量 (ppm)	農藥		檢出限量 (ppm)
英文名	中文名		英文名	中文名	
α -BHC	α -蟲必死	0.01	Endrin	安特靈	0.01
cis-chlordane	順式-可氯丹	0.01	Esfenvalerate	益化利	0.02
β -BHC	β -蟲必死	0.01	Fenarimol	芬瑞莫	0.02
trans-chlordane	反式-可氯丹	0.01	Fenpropathrin	芬普寧	0.08
Aldrin	阿特靈	0.01	Fenvalerate	芬化利	0.03
Alphacypermethrin	亞滅寧	0.05	Flucythrinate	護賽寧	0.05
Benfluralin	倍尼芬	0.01	Fluvalinate	福化利	0.05
Bifenox	必芬諾	0.01	Heptachlor	飛佈達	0.01
Bifenthrin	畢芬寧	0.03	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.01
Bromopropylate	新殺蟎	0.02	Hexaconazole	菲克利	0.02
Bupirimate	布瑞莫	0.03	Iprodione	依普同	0.05
Butralin	比達寧	0.05	Isoprothiolane	亞賜圃	0.02
Captafol	四氯丹	0.05	Lindane	靈丹	0.01
Captan	蓋普丹	0.01	Mirex	滅蟻樂	0.01
Chinomethionat	蟎離丹	0.01	Myclobutanil	邁克尼	0.05
Chlorfenapyr	克凡派	0.01	Penconazole	平克座	0.02
Chlorfluazuron	克福隆	0.03	Permethrin	百滅寧	0.10
Chloropropylate	克氯蟎	0.05	pp'-DDE	滴滴易	0.01
Chlorothalonil	四氯異苯腈	0.01	pp'-DDT	滴滴涕	0.01
Chlozolate	克氯得	0.01	Pretilachlor	普拉草	0.05
Cyfluthrin	賽扶寧	0.05	Prochloraz	撲克拉	0.03
Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	Procymidone	撲滅寧	0.05
Cypermethrin	賽滅寧	0.05	Profenophos	佈飛松	0.02
Deltamethrin	第滅寧	0.01	Propiconazole	普克利	0.03
Dichlofluanid	益發靈	0.01	Pyridaben	畢達本	0.05
Dicloran	大克爛	0.01	Pyridaphenthion	必芬松	0.10
Dicofol	大克蟎	0.02	Pyrifenox	比芬諾	0.03
Dieldrin	地特靈	0.01	Tetradifon	得脫	0.02
Difenoconazole	待克利	0.05	Triadimefon	三泰芬	0.01
Diniconazole	達克利	0.03	Trifluralin	三福林	0.01
Dinitramine	撻乃安	0.01	Vinclozolin	免克寧	0.01

農藥		檢出限量 (ppm)	農藥		檢出限量 (ppm)
英文名	中文名		英文名	中文名	
Endosulfan	安殺番	0.01			

註：茶類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)之檢出限量為表列數值之 5 倍。

表三、歐殺松等 49 項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數（正離子模式）

項次	分析物		定量離子對			定性離子對		
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)
1	Acephate	歐殺松	184>143	18	8	184>125	18	18
2	Azinphos-methyl	谷速松	318>160	16	7	318>261	16	6
3	Bupirimate	布瑞莫	317>166	32	24	317>108	32	27
4	Chlorfluazuron	克福隆	540>383	32	20	540>158	32	20
5	Chlorpyrifos	陶斯松	352>200	23	19	350>198	23	19
6	Chlorpyriphos-methyl	甲基陶斯松	324>125	25	20	324>292	25	15
7	Cyanofenphos	施力松	304>157	23	20	304>120	23	20
8	Demeton-S-methyl	滅賜松	231>89	13	10	231>61	13	32
9	Dichlofluanid	益發靈	333>224	21	11	333>123	21	26
10	Difenoconazole	待克利	406>251	37	23	406>111	37	57
11	Dimethoate	大滅松	230>199	17	9	230>125	17	23
12	Disulfoton	二硫松	275>89	14	12	275>61	14	35
13	Ditalimfos	普得松	300>148	20	19	300>130	20	32
14	Ethoprophos	普伏松	243>131	23	20	243>97	23	32
15	Fenamiphos	芬滅松	304>217	26	22	304>202	26	35
16	Fenarimol	芬瑞莫	331>268	38	20	333>270	38	20
17	Fensulfothion	繁福松	309>157	28	23	309>173	28	23
18	Fenthion	芬殺松	279>169	27	16	279>247	27	13
19	Fonofos	大福松	247>137	19	11	247>109	19	22
20	Hexaconazole	菲克利	314>70	31	20	314>159	31	36

表三、歐殺松等 49 項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數（正離子模式）（續）

項次	分析物		定量離子對			定性離子對		
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)
21	Iprobenfos	丙基喜樂松	289>91	17	22	289>205	17	9
22	Malathion	馬拉松	331>127	20	12	331>99	20	25
23	Mephosfolan	美福松	270>140	25	25	270>75	25	20
24	Methacrifos	---	241>209	21	9	241>125	21	19
25	Methamidophos	達馬松	142>94	21	13	142>125	21	13
26	Methidathion	滅大松	303>145	19	10	303>85	19	22
27	Mevinphos	美文松	225>193	20	8	225>127	20	16
28	Monocrotophos	亞素靈	224>127	20	16	224>98	20	13
29	Myclobutanil	邁克尼	289>70	28	16	289>125	28	30
30	Omethoate	歐滅松	214>125	19	22	214>183	19	11
31	Penconazole	平克座	284>159	23	28	284>70	23	16
32	Phenthoate	賽達松	321>163	20	11	321>135	20	19
33	Phorate	福瑞松	261>75	16	10	261>97	16	26
34	Phosalone	裕必松	368>182	23	17	368>111	23	41
35	Phosphamidon	福賜米松	300>174	29	13	300>127	29	21
36	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松	334>198	34	22	334>182	34	21
37	Pirimiphos-methyl	甲基亞特松	306>164	35	22	306>108	35	31
38	Profenofos	佈飛松	373>128	29	45	373>302	29	19
39	Propiconazole	普克利	342>69	34	19	342>159	34	37
40	Pyraclofos	白克松	361>257	35	23	361>97	35	31

表三、歐殺松等 49 項農藥之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數（正離子模式）（續）

項次	分析物		定量離子對			定性離子對		
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	進樣錐電壓 (V)	碰撞能量 (eV)
41	Pyrazophos	白粉松	374>222	36	23	374>194	36	33
42	Pyridaben	畢達本	365>147	20	26	365>309	20	14
43	Pyridaphenthion	必芬松	341>189	30	22	341>92	30	38
44	Pyrifenox	比芬諾	295>93	31	22	295>67	31	60
45	Terbufos	托福松	289>103	12	8	289>57	12	17
46	Triadimefon	三泰芬	294>69	27	21	294>197	27	15
47	Triazophos	三落松	314>162	26	18	314>119	26	35
48	Trichlorfon	三氯松	257>109	25	17	257>79	25	30
49	Vamidotion	繁米松	288>146	17	13	288>118	17	22

註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。

表四、 α -蟲必死等 65 項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數

項次	分析物		定量離子對		定性離子對	
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)
1	α -BHC	α -蟲必死	181>145	25	181>109	25
2	β -BHC	β -蟲必死	181>145	25	181>109	25
3	cis-chlordane	順式-可氯丹	373>266	20	375>301	10
4	trans-chlordane	反式-可氯丹	373>266	20	375>301	10
5	Aldrin	阿特靈	263>193	35	263>226	20
6	Alphacypermethrin	亞滅寧	163>91	15	199>127	8
7	Benfluralin	倍尼芬	292>206	15	292>160	15
8	Bifenox	必芬諾	341>310	10	341>281	15
9	Bifenthrin	畢芬寧	181>166	10	181>153	10
10	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	359>303	15	359>331	10
11	Bromophos-methyl	甲基溴磷松	331>316	25	331>286	30
12	Bromopropylate	新殺蟎	183>155	15	341>185	20
13	Butralin	比達寧	266>174	20	266>190	15
14	Captafol	四氯丹	183>78.6	25	149>105.4	7
15	Captan	蓋普丹	149>79	15	149>105	5
16	Carbophenothion	加芬松	342>157	11	342>296	5
17	Chinomethionat	蟎離丹	206>148	20	234>148	20
18	Chlorfenapyr	克凡派	247>227	15	247>200	25
19	Chloropropylate	克氯蟎	139>111	15	251>139	15
20	Chlorothalonil	四氯異苯腈	266>168	30	266>229	20

表四、 α -蟲必死等 65 項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數 (續)

項次	分析物		定量離子對		定性離子對	
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)
21	Chlozolate	克氯得	331>259	10	259>188	15
22	Cyfluthrin	賽扶寧	163>91	15	163>127	8
23	Cyhalothrin	賽洛寧	181>152	25	197>141	15
24	Cypermethrin	賽滅寧	163>91	15	163>127	8
25	Deltamethrin	第滅寧	253>93	22	253>174	10
26	Diazinon	大利松	304>179	10	304>162	10
27	Dichlorvos	二氯松	185>93	15	185>109	20
28	Dicloran	大克爛	206> 175	15	206>148	25
29	Dicofol	大克蟎	139>111	15	251>139	15
30	Dieldrin	地特靈	263>193	35	263>228	20
31	Diniconazole	達克利	268>232	10	268>135	40
32	Dinitramine	撻乃安	261>195	20	216>195	10
33	Endosulfan	安殺番	241>206	20	241>170	25
34	Endrin	安特靈	263>193	35	263>228	20
35	EPN	一品松	157>77	25	157>110	15
36	Esfenvalerate	益化利	225>119	20	225>147	10
37	Ethion	愛殺松	231>175	15	231>185	13
38	Fenitrothion	撲滅松	277>109	25	277>260	5
39	Fenpropathrin	芬普寧	265>210	10	265>89	35
40	Fenvalerate	芬化利	225>119	20	225>147	10

表四、 α -蟲必死等 65 項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數 (續)

項次	分析物		定量離子對		定性離子對	
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)
41	Flucythrinate	護賽寧	199>157	10	199>107	25
42	Fluvalinate	福化利	250>200	20	250>208	25
43	Formothion	福木松	224>125	20	224>155	10
44	Heptachlor	飛佈達	272>237	20	237>143	30
45	Heptachlor Epoxide	環氧飛佈達	353>263	15	353>282	15
46	Iprodione	依普同	314>245	10	314>271	10
47	Isoprothiolane	亞賜圃	290>204	5	290>118	5
48	Isoxathion	加福松	105>77	10	105>51	30
49	Lindane	靈丹	181>145	25	181>109	25
50	Mirex	滅蟻樂	272>237	20	332>262	30
51	Parathion-ethyl	巴拉松	291>109	15	291>137	10
52	Parathion-methyl	甲基巴拉松	125>47	15	125>79	5
53	Permethrin	百滅寧	183>153	15	183>168	10
54	Phosmet	益滅松	160>134	10	160>106	10
55	pp'-DDE	滴滴易	246>176	25	246>211	25
56	pp'-DDT	滴滴涕	235>165	25	235>200	20
57	Pretilachlor	普拉草	176>147	15	176>134	15
58	Prochloraz	撲克拉	308>70	15	308>202	10
59	Procymidone	撲滅寧	283>95	25	283>255	15
60	Prothiofos	普硫松	267>239	10	267>221	20

表四、 α -蟲必死等 65 項農藥之氣相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數（續）

項次	分析物		定量離子對		定性離子對	
	英文名	中文名	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)	前驅離子 (m/z) > 產物離子 (m/z)	碰撞能量 (eV)
61	Quinalphos	拜裕松	298>156	5	298>190	5
62	Salithion	殺力松	216>201	10	216>183	10
63	Tetradifon	得脫蟊	356>159	25	356>229	25
64	Trifluralin	三福林	306>264	15	306>206	15
65	Vinclozolin	免克寧	285>212	10	285>178	15

註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。