


仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	樂久飛-散劑 (LAC-B Granular Powder N)	申請廠商	天澤貿易股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥輸字第 002739 號		

樂久飛-散劑

LAC-B Granular Powder N ラクベ 微粒 N

衛署藥輸字第002739號
醫師藥師藥劑生指示藥品



【藥效藥理】

腸內菌叢改善作用

健康正常成人服用本劑時，Bifidus菌會增殖，增加腸內之優勢菌叢，促進腸內菌叢之正常化，同時Bifidus菌所產生的酸，能降低腸內PH，形成不利於有害細菌生長之環境。

【成分】有效成分及含量：每公克散劑含Bifidus菌 (Bifidobacterium之活菌) 10mg

其他成分(賦形劑)：Corn starch, Lactose hydrate.

【用途(適應症)】緩解輕度腹瀉，腹痛及便秘，整腸(調整排便)，軟便。

【使用上注意事項】

一. 有下列情形者，請勿使用：

- (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二)對牛乳或乳製品耐受低的人。

二. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一)三歲以下。
- (二)消化道潰瘍的人。

三. 有下列情形者，使用前請先洽詢醫師藥師藥劑生：

- (一)孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二)與其他藥品併用時。

四. 其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射
- (三)25°C以下貯存。
- (四)勿超過建議使用量。
- (五)有發燒症狀時，使用不得超過48小時。
- (六)一天不可不服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

【警 語】

一. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書，諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
腸胃道	偶有脹氣。

二. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

6-1000包鋁箔袋盒裝(每包一公克)。

【貯存】

氣密容器、25°C以下保存

【批發及保存期限】

標示於外盒

市售藥品得僅放置經審查核定之中文仿單。但如市售藥品同時放置中、外文仿單者，外文仿單內容須與核定本之中文仿單內容相符，廠商得依核定之中文仿單自行修正其外文仿單內容。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及未滿12歲	一天3至4次，或需要時服用。1次1包。
6歲以上及未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
3歲以上及未滿6歲	適用成人劑量之1/4。
未滿3歲	請洽醫師診治。

藥商：天澤貿易股份有限公司

台北市中山區新生北路二段133巷1號7樓 TEL:02-2561-7768

製造廠：Kowa Company, Ltd. (Mohka plant)

21-1 Matsuyama-cho Mohka Tochigi, Japan