

**Tancosil****Tancosil****Tancosil**

“皇家” 痰 可 治 錠 200 毫克

Tancosil Tablets 200mg “Royal”

咳嗽係由咳嗽中樞受刺激，或由黏痰分泌黏稠過多，以致咯出困難，刺激氣管黏膜而引起。因之咳嗽之緩解須鎮靜咳嗽中樞，同時須除去分泌物或炎症等刺激因素。本藥為末稍性祛痰劑，可增加氣管內分泌物使痰液稀釋更容易咯出，同時對支氣管肌肉之緊張具有鬆弛作用。

【成分】

有效成分及含量：每錠含有

Glyceryl Guaiacolate	200 mg
----------------------	--------

其它成分(賦形劑)：

Cellulose microcrystalline、Lactose、Corn starch、Magnesium stearate、Primojel、PVP K-30。

【用途(適應症)】祛痰。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
 - (2) 3 歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 勿超過建議使用量。
 - (4) 不得與含酒精飲料併用。

【用法用量】

年 齡	劑 量
成人及12歲以上	每次1錠。一天4至6次，每次間隔至少4小時。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4
3歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 若有任何不適情形產生。
 - (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

【包裝】8 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存】於 25℃ 以下貯存，並放置在孩童無法取得處。



皇家化學製藥股份有限公司

ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.

高雄市鳥松區空埔里埔安街1號 電話：(07)7310537

傳真：(07)7310538