

Front

Back



### 成分

**有效成分及含量：**Acetaminophen (乙醯胺酚) 500毫克及Caffeine (咖啡因) 65毫克。  
**其他成分 (賦形劑)：**Starch Pregelatinised, Calcium Carbonate, Alginate Acid, Purified Water, Crospovidone, Povidone, Opadry White YS-1-7003, Sodium Parabens, Magnesium Stearate, Carnauba Wax.

### 作用

普拿疼止痛加強錠經臨床證實為一有效之鎮痛、解熱劑。其鎮痛、解熱效果與阿斯匹靈相等，但不似阿斯匹靈或含阿斯匹靈之藥品會導致許多副作用。  
 普拿疼止痛加強錠適用於解除各種疼痛，例如：頭痛、月經痛、肌肉骨骼疼痛、肌肉痛及神經痛等。同時亦可用於伴有不適感及發燒之病症的止痛解熱，例如感冒、牙科手術及拔牙後。普拿疼止痛加強錠含咖啡因，口服後，可溫和地刺激中樞神經，使人保持清醒且對疲勞的人有提神的功效。咖啡因經常與乙醯胺酚合併使用，當作迅速有效的頭痛治療劑。經文獻可知，與單純含有Acetaminophen 500mg的藥錠相比，併含咖啡因可提供的止痛強度預測為增加37%。

### 產品特性

普拿疼止痛加強錠的OPTIZORB®技術，可促進本藥快速崩散、快速溶解，且與一般含乙醯胺酚及咖啡因的錠片相比，服用30分鐘後吸收速度快3倍，提早15分鐘到達人體血中，快50%發揮療效，但是血中的乙醯胺酚及咖啡因的總吸收量沒有差別，並於24小時後排出體外(超過95%)。  
 普拿疼止痛加強錠在空腹時服用可在10分鐘開始發揮療效，在餐後服用時也可以在22分鐘後發揮療效。

### 用途 (適應症)

發燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

### 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
  1. 曾因藥物或因本藥成分引起過敏的人。
  2. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  3. 12歲以下。
  4. 正在服用其他含acetaminophen (paracetamol) 的處方或非處方藥治療疼痛、發燒、感冒徵狀或幫助睡眠的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 成人連續服用本藥超過7天，症狀未緩解的人。
  2. 現正服用Warfarin等抗凝血劑的人。
  3. 有肝腎臟問題、體重過輕或營養不良、經常飲酒的人。您可能需要避免併用本藥或限制所服用之acetaminophen劑量。
  4. 有嚴重感染的人可能增加代謝性酸中毒的風險。
- 其他使用上注意事項：
  1. 請閱讀並遵照仿單說明書指示。
  2. 須置於兒童眼界未及且接觸不到之處。為防止兒童誤食請妥善保管。避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

AAAV-90X(F) 984250

5. 本藥含acetaminophen，服用過量的acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含acetaminophen成分的藥品，但是每天服用acetaminophen超過4000毫克(8錠)會發生肝臟損害。
6. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen (paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
7. 偶有過敏反應。在建議使用量下服用，少有副作用發生。

### 用法用量

醫師藥師藥劑生指示藥品

成人及12歲以上	每次1-2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。發燒或疼痛時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，兩次間隔請勿短於4小時，每24小時內不可超過4次。請勿超過建議劑量(4000毫克；8錠)。請勿併服其他含acetaminophen(乙醯胺酚)的藥品。
12歲以下	請勿使用。

### 警語

● 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	症狀
皮膚	發疹、脫屑、發癢、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	口腔潰瘍、未預期創傷或出血

● 服用本藥品後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 曾有服用阿斯匹靈或其他非類固醇抗發炎藥品而出現呼吸困難，且服用本藥出現類似症狀的人。
3. 有過敏情形，例如：臉、唇舌及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。
4. 有代謝性酸中毒徵兆(包含：深且急促的呼吸困難、噁心嘔吐、食慾不振)。
5. 服用過量(每日超過4000毫克；8錠)，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

### 包裝

2-1000錠ALU-PVC鋁箔盒、塑膠瓶裝。

### 儲存條件

30°C以下。

\* 衛部藥輸字第026245號



藥商 / 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司  
 台北市忠孝西路一段66號24樓  
 諮詢專線：0800-212259  
 製造廠 / GlaxoSmithKline Dungarvan Limited  
 Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland  
 分包裝廠 / Sterling Drug (Malaya) Sdn. Bhd.  
 Lot 89, Jalan Enggang, Ampang/Ulu Kelang Industrial Estate,  
 54200 Selangor, Malaysia

Panadol, 普拿疼及OPTIZORB為葛蘭素史克集團所有或經授權的商標  
 ©2016 GSK group of companies. All rights reserved.



208 mm

25 mm  
8 mm