

# 斯斯 感冒膠囊

## スズレックス 風邪カプセルA



斯斯感冒膠囊是非比林系的綜合感冒藥，有感冒前兆、流鼻水、疲勞、酸痛、精神不振，請早服用以免導致二次感冒，如症狀消失，勿長期使用易致成癮。

【成分】

有效成分及含量：

| 有效成分                     | 每粒膠囊中含有 | 主 要 作 用                |
|--------------------------|---------|------------------------|
| Acetaminophen            | 100mg   | 解熱、頭痛、關節痛的緩和           |
| Ethenzamide              | 83.33mg |                        |
| Codeine Phosphate        | 3mg     | 鎮咳                     |
| Chlorpheniramine Maleate | 1.25mg  | 感冒的過敏症狀（流鼻水、打噴嚏、淚眼）的抑制 |
| dl-Methylephedrine HCl   | 6.67mg  | 擴張支氣管、鎮住強烈的咳嗽使喉嚨舒服     |
| Caffeine anhydrous       | 20mg    | 腦血管活動、緩和感冒所引起的頭痛、防止睏倦  |

其他成分(賦形劑)：Lactose 200、Lactose monohydrate 100 mesh、Talc、Magnesium Stearate、Capsule No.1 (Gelatin、Purified water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、Erythrosine、Tartrazine、Titanium Dioxide)

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- 1.曾因本藥成分引起過敏的人。
- 2.曾因本藥或其他感冒藥、止痛藥引起氣喘的人。
- 3.有蠶豆症的人。
- 4.懷孕28週以上的婦女。
- 5.哺乳婦。
- 6.18歲以下之水痘或流行性感感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- 1.12歲以下。
- 2.有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
- 3.有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- 4.吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- 5.有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- 6.有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- 1.孕婦、可能懷孕婦女。
- 2.正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- 3.同時服用含acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 4.曾有消化性潰瘍的人。

5.服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射。
- 3.勿超過建議使用量。
- 4.不要服用本藥超過7日，長期使用易致成癮。
- 5.服用過量的acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含acetaminophen成分的藥品，但是每天服用acetaminophen超過4000毫克(相當於本藥40粒)會發生肝臟損害。
- 6.酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
- 7.可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- 8.避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

|           |                |
|-----------|----------------|
| 成人及15歲以上  | 一次2粒，一天2次，飯後服用 |
| 8歲以上未滿15歲 | 一次1粒，一天2次，飯後服用 |

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用                 |
|------|---------------------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、皮膚癢           |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食欲不振、便秘       |
| 神經系統 | 頭暈、耳鳴               |
| 其他   | 喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊 |

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.若有任何不適情況產生。
- 2.咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- 3.症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- 4.喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- 5.服用過量[每日超過acetaminophen 4000毫克(相當於本藥40粒)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- 6.有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【包裝】8-1000粒PTP鋁箔盒裝。

【儲存】儲存於25℃以下。

醫師藥師藥劑生指示藥品  
衛署藥製字第032026號  
GMP優良藥品 G-1513號



木一ユ一 株式會社 商標授權  
五洲製藥股份有限公司  
通過 PIC/S GMP 優良藥廠  
桃園市新屋區赤欄里17-1號

I08-1  
v4.00