

健胃固腸 · 常備良藥

金十字胃腸藥[®]

【成分】每公克包含：

【有效成分與含量】

Sodium Bicarbonate 740mg、Magnesium Carbonate 80mg、
Glycyrrhiza 甘草 100mg、Rheum 大黃 13mg、Gentian 龍膽 13mg、
Cinnamon 桂皮 25mg、Clove 丁香 25mg、Menthol 薄荷 4mg

【用途（適應症）】

消化不良、腹部膨滿、胃酸過多、胃痛、健胃固腸

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

（一）曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

（一）2歲以下的人。

（二）消化道潰瘍的人。

（三）須限鹽飲食的人。

（四）有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

（二）與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：

（一）為防止兒童誤食請妥善保管。

（二）避免陽光直射。

（三）勿超過建議使用量。

（四）一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量14天以上。

（五）如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。

（六）腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。

（七）可能引起腹脹、打嗝。

【用法用量】

年 齡	成 人	7-15 歲	4-7 歲	2-4 歲
用 量	1 匙	1/2 匙	1/3 匙	1/6 匙
用 法	每日 3 次，以開水服用。（內附 1.2 公克量匙）			

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

（一）若有任何不適情況產生。

（二）連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

50、95、450 克罐裝（附 1.2 公克量匙一隻）、1.2 公克 100 包盒裝。

【儲存】

儲存於 25℃ 以下。

內衛成製字第 0863 號



新萬仁化學製藥股份有限公司
Hsin Wan Jen Chem. & Pharm. Co., Ltd.
台中市豐原區文賢街 158 號

