

# 賜你免痛 綜合感冒膜衣錠

## Sulimeton Common Cold F.C Tablets

【PIC/S GMP優良藥品】

### 【成分】

**有效成分及含量：**Acetaminophen(乙醯胺酚) 325 毫克、Caffeine Anhydrous 40 毫克、Phenylephrine HCl 4 毫克、Chlorpheniramine Maleate 2 毫克、Potassium Guaiaacolsulfonate 80 毫克、Noscapine 15 毫克。  
**其他成分(賦形劑)：**Potato Starch, Povidone, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Talc, Opadry II 85F92797 Yellow

### 【藥效藥理作用】

1. Acetaminophen 為解熱鎮痛劑，具中樞性解熱鎮痛作用，能緩解感冒引起之發燒、頭痛，骨關節疼痛等。
2. Chlorpheniramine Maleate 為 antihistamine 對於各種由感冒或過敏引起之鼻塞，流鼻水有效。
3. Noscapine 能抑制延腦咳嗽中樞，反制咳嗽反射，有效緩解惱人的咳嗽。本品不會抑制呼吸道的正常分泌且不會影響痰液的排出。
4. Potassium Guaiaacolsulfonate 具祛痰作用。
5. Phenylephrine HCl 是一種鼻充血解除劑，具收縮鼻黏膜血管，抑制充血、腫脹功效。對於感冒引起的鼻塞，能促進鼻道暢通。

### 【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

### 【使用上注意事項】

- 請詳閱說明書後依指示使用
- 一、有下列情形者，請勿使用
    1. 曾因本藥引起過敏症狀的人。
    2. 本藥含 Phenylephrine HCl，服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥。如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。
  - 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
    1. 12 歲以下。
  - 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
    1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
    2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
    3. 併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
    4. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽的人。
    5. 青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
    6. 有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難的人。
  - 四、其它使用上注意事項
    1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
    2. 避免陽光直射。
    3. 勿超過建議劑量。
    4. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
    5. 不要服用本藥超過七日
    6. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
    7. 本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：
      - (1) 應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。
      - (2) 為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

8. 肝毒性：
  - (1) 使用 Acetaminophen 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 Acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 Acetaminophen 成分之藥品。
  - (2) 應注意藥品的標示中是否含有 Acetaminophen 或 Paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 Acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
9. 不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 Acetaminophen 而增加肝毒性危險。
10. 過量：
  - (1) 服用過量 Acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
  - (2) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
  - (3) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝毒性的臨床證據可能要等到攝入後 48-72 小時才明顯可見。
11. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 Acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。
12. 嚴重皮膚反應：使用 Acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰瘡(AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(SJS)和毒性表皮壞死溶解症(TEN)。出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

### 【用法用量】

年齡	用法用量
12 歲以上	一日 3 次，每次 1 錠

### 【警語】

- 一、服用本藥品後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
胃腸道	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其它	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊
- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
  1. 若有任何不適情況產生。
  2. 咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
  3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
  4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品  
衛部藥製字第 058634 號

【包裝】6-1000 錠 PTP 鋁箔盒裝

【儲存】應存放於 30°C 以下，避免陽光直射之陰涼處。



**三洋藥品工業股份有限公司**  
高雄市苓雅區中正二路 175 號 23 樓  
製造廠：三洋藥品工業股份有限公司 大發廠  
高雄市大發工業區華西路 45 號