



衛署藥製字第030689號

合利他命®-愛糖衣錠25毫克

ALINAMIN®-A25 SUGAR-COATED TABLETS

合利他命®-愛糖衣錠係完全採用日本武田藥品工業株式會社アリナミンA25之處方、原料、技術製造而成，含有合利他命-F® (一般名Fursultiamine) · 與神經肌肉之機能有密切關係之維生素B₆ · B₁₂ · 及維生素B₂之製劑。

【特長】

本劑所含的合利他命 - F®(Fursultiamine)係維生素B₁ 誘導體，具有下列特長：

1. 易由腸管吸收，顯示出高的血中濃度。
2. 易移行至神經及肌肉等組織。
- 3 能在體內產生高量之結合型維生素B₁(Cocarboxylase)。

【成分】

有效成分及含量 (每錠含)

Fursultiamine (維生素B ₁ 誘導體)	25mg
(Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide HCl)	27.288mg
Riboflavin (維生素B ₂)	2.5mg
Pyridoxine HCl (維生素B ₆)	2.5mg
Cyanocobalamin (維生素B ₁₂)	5µg

其他成分 (賦形劑)

Corn Starch, Gelatin, Magnesium Stearate, Lactose, Talc, Acacia Powder, Titanium Oxide, Purify sucrose, Shellac Pearl-N, Castor Oil, Glyceryl Monostearate, Carnauba Wax, White Beeswax, n-Hexane

【用途 (適應症)】

維生素B₁、B₆、B₁₂等缺乏所引起之下列疾患〈神經痛、肌肉痛、腰痛、肩膀酸痛、腳氣病〉，身體疲勞時、妊娠授乳期、病中病後之營養補給。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)6歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)為了避免誤用，保持品質，請勿換裝於其他容器中。

(五)瓶內所放之充填物(poly sheet)是為防止輸送過程中引起之破損，因此開啟瓶蓋後，請將此充填物丟棄。

(六)使用後請將瓶蓋拴緊，以免藥品受到濕氣等影響而變質。

(七)開封後，請於六個月內使用完畢。

(八)服用本藥後，尿液如有呈現黃色之現象，此係本藥中所含之維生素B₂所引起，不必掛慮。

【用法用量】

不必咬碎並請立即吞服。依年齡、症狀可適宜增減用量。

成人 1日3-4 錠，分2-3次 飯後服用。

【警語】

一、服用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹。
消化器官	噁心、胸灼熱感、胃部不適感、下痢。

二、服用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況發生。

【包裝】

6-1000錠玻璃瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲藏】儲存於25 °C以下

委託者：台灣武田藥品工業股份有限公司
台北市信義區松高路1號17樓
消費者諮詢專線：0800-008-999 (09:00-17:00 例假日除外)
製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

®註冊商標(武田藥品工業株式會社授權)