

斯 斯 鼻 炎 膠 囊

スズレックス 鼻炎カプセル

Suzulex Bien A Capsule



氣候變化，容易引起鼻炎、鼻過敏、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、頭重等感冒初期症狀，造成鼻黏膜充血和呼吸道黏膜抵抗力減弱，請早服用以免導致二次感染。

【成分】 有效成分及含量：

有效成分	每粒膠囊中含有	主要作用
Pseudoephedrine HCl	60 mg	收縮鼻黏膜血管，解除鼻充血、鼻塞的症狀。
Chlorpheniramine maleate	3 mg	打噴嚏、流鼻水、鼻塞、過敏性症狀的抑制。
Belladonna total alkaloids	0.13 mg	對淚眼、流鼻水有緩解作用。
Monoammonium Glycyrrhizinate	20 mg	防止黏膜發炎、口乾。
Caffeine anhydrous	40 mg	活動腦血管、緩和頭重及防止睏倦。

其他成分(賦形劑)：Lactose anhydrous、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Magnesium Stearate、Capsule No.1 (Gelatin、Purified water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、Food color Red No. 6、Food color Blue No. 1、Titanium Dioxide)。

【用途(適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- 1.曾因本藥成分引起過敏的人。
- 2.哺乳婦。(因本藥含Belladonna total alkaloids)
- 3.服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- 1.3歲以下。
- 2.嚴重代謝性肝腎疾病的人。
- 3.曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
- 4.有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- 1.孕婦及可能懷孕婦女。
- 2.65歲以上。
- 3.服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 4.服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等藥品的人；或服用含副交感神經阻斷劑的胃腸鎮痙攣痛藥的人。
- 5.有高燒、排尿困難、水腫的人。(因本藥含Monoammonium Glycyrrhizinate)

四、其他使用上注意事項：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。

- 2.避免陽光直射。
- 3.勿超過建議使用量。
- 4.不得與酒精性飲料併用。
- 5.可能引起嗜睡或異常的刺眼，請勿駕車或操作危險性機械。
- 6.避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【用法用量】

成人及12歲以上	一次1粒，一天3次，飯後服用。
6歲以上未滿12歲	一次 1/2 粒，一天3次，飯後服用。
3歲以上未滿6歲	一次 1/4 粒，一天3次，飯後服用。
3歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化系統	想吐、嘔吐、食欲不振
神經系統	倦怠感、興奮、暈眩、失眠、神經過敏、頭痛
其他	臉部發燙、口乾、異常的刺眼、視覺上之困擾

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.若有任何不適情況產生，如手腳疲倦、麻痺、緊繃感或僵硬、無力感、肌肉痛，且症狀有逐漸惡化等。
- 2.若有任何不適情況產生，如皮膚發癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識不清等。
- 3.若有任何不適情況產生，如瘀青、鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚或黏膜呈現蒼白色、血尿，或突然高燒、發冷、喉嚨疼痛等。
- 4.連續服用本藥5~6日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

6-21粒PTP鋁箔盒裝。

【儲存】

保存在 25℃ 以下，密封放在沒有陽光直射之處。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第 032037 號
GMP 優良藥品 G-1518 號



ホーユー 株式会社 商標授權
五洲製藥股份有限公司
通過 PIC/S GMP 優良藥廠
桃園市新屋區赤欄里17-1號