

婦女用藥 小百科

懷孕藥品 分級說明

感謝奇美柳營醫院藥學部提供



我們常說孕婦是「一人吃，兩人補」，但是孕婦服藥則可能「一人吃，一人受害」。

胎兒透過胎盤攝取養分，若母體吃藥有部份藥品可能會透過胎盤進入胎兒體內。但藥品對於胎兒是否造成傷害，沒有任何人能夠給一定的答案，只能以機率大小來說明。

因此，若想要懷孕或是吃藥後發現懷孕，或是懷孕期間就醫，需告知醫師，與醫師討論其利弊得失，或請藥師提供相關資料，交由醫師判斷是否用藥，用什麼藥，或產檢時需注意哪些等等。

級別・定義

級別	定義
A	在設計有對照組的研究中（較可靠），無法證明懷孕初期使用會危害胎兒。
B	以動物做試驗，無法證明對胎兒有害，且沒有以人做較嚴謹的研究。或動物試驗報告對胎兒有害，但針對懷孕婦女有對照組的研究中無法證明對胎兒有害。
C	動物試驗顯示有致畸胎的結果，但沒有針對孕婦或動物有對照組的研究可證明其危險性。
D	已證實對人之胎兒有傷害，若是疾病對於孕婦有生命威脅或安全的藥品已無法治療的情況下，權衡利弊，仍可使用。
X	動物或人體的試驗中或使用經驗發現對胎兒有害，而造成的傷害明顯大於可能的益處。