

必達定[®]殺菌清潔液

Betadine[®] Scalp & Skin Cleanser

【成分】

有效成分及含量: Povidone-Iodine 7.5% w/v(每毫升含 Povidone Iodine 75mg)。

其他成分(賦形劑): Ammonium Nonylphenyl Ether Sulphate、Lauric Diethanolamide、

Ethoxylated Lanolin 50%、Hydroxyethylcellulose Ph Eur、Sodium Hydroxide Ph Eur、Purified Water Ph Eur。

【用途(適應症)】:傷口消毒。

必達定殺菌清潔液適用於皮膚和頭皮脂漏性病變、尋常性痤瘡(青春痘)及其他膿性皮膚病變。

【使用上注意事項】

✓ 有下列情形者，請勿使用

- (1) 對碘或本藥成分過敏的人。
- (2) 有甲狀腺疾病的人。
- (3) 接受放射性碘治療之前四週與之後。
- (4) 進行診斷性甲狀腺檢查前後 1~2 週內。
- (5) 進行放射性碘核醫顯影檢查。
- (6) 正在服用鋰劑的人。
- (7) 未滿兩歲之嬰幼兒。

✓ 有下列情形者，請洽醫生診治


- (1) 兒童、懷孕、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (2) 深部皮膚組織感染。
- (3) 65 歲以上。
- (4) 若腎功能不良者需持續使用本藥時。

✓ 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- (1) 同時使用含有酵素性傷口護理藥品、過氧化氫(雙氧水)、消毒劑、牛磺羅定或含銀的產品。
- (2) 同時使用含汞產品。

✓ 其他使用上注意事項

- (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2) 避免陽光直射。
- (3) 勿超過建議使用量，不可長期(超過 14 天)使用。
- (4) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- (5) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- (6) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
- (7) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。



- (8) 以本藥治療開放傷口時，應避免使用其他含清潔劑之液劑。
- (9) 本藥會使皮膚或衣物染色，可利用溫水與肥皂清除，或到藥局購買氨水或硫代硫酸鈉清除難以清洗之汗漬。
- (10) 使用本藥可能會影響糞便潛血或血尿檢驗之結果。
- (11) 若本藥嚴重褪色，請勿使用。

【用法用量】

成人、老人及兒童:	
治療頭髮與頭皮病症： 將頭髮完全打濕後，將本產品作為洗髮精，用於頭髮和頭皮，並且確實搓揉。放置至少 5 分鐘後，再以溫水沖洗乾淨。隨後再使用一次，將其搓出泡沫後沖洗乾淨。每週使用兩次，直到狀況獲得改善。	
治療臉部、頸部和身體病症： 直接使用或擠於打濕的海綿上使用，並仔細清洗患處。隨後再使用一次，以溫水沖洗乾淨後，再以乾淨或無菌毛巾或紗布擦乾。每天使用兩次（早上和晚間），直到完全緩解。	
外用液劑，僅供外用。	

【警語】

- ✓ 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發癢、發紅、小水泡或類似症狀。 局部刺激或敏感。

- ✓ 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
- (1). 若有任何不適狀況或使用後症狀未改善，或症狀有改善，但停藥後病情又復發。
- (2). 急性全身過敏反應，如：血壓下降及/或呼吸急促等現象。
- (3). 碘使用過量可能引發口中金屬味、唾液增加、口腔或喉嚨灼燒或疼痛、眼部刺激與腫脹、呼吸困難、皮膚反應、腸胃不適與腹瀉、代謝性酸中毒、高血鈉症，並可能導致腎功能障礙。

【藥物性質】

Povidone-iodine 在施用後會持續釋放碘一段時間。元素碘(I₂)已知為具高度殺菌效果之殺菌劑，可在體外快速殺死細菌、病毒、黴菌和部分原蟲。大多數微生物繁殖體皆在體外不到一分鐘內被殺死，許多更是在 15 至 30 秒內死亡。在此過程中，碘會褪色；因此，棕色強度可作為其有效性的指標。一旦顏色變淡，可能需要重複施予，目前未曾報告過抗藥性。

Povidone iodine 與人類發炎作用細胞和發炎介質（抑制微生物致病因素、組織破壞酵素、細胞介素和氧自由基之清除）互相作用，導致發炎反應下降，也可能具有某些止血效果。

【包裝】

- ◆ 4000 毫升以下之塑膠瓶裝。
- ◆ 保存於 25°C 以下。

製造廠

製造廠名稱：Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

製造廠地址：13, Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus

藥商

藥商名稱：台灣萌蒂藥品有限公司

藥商地址：臺北市信義區松仁路 32 號 14 樓