

制酸劑

"信隆"

氫氧化鎂錠

Magnesium Hydroxide Tablets "Shinlon"

【成分】

有效成分及含量：每錠含 Magnesium Hydroxide300mg

其他成分(賦形劑)：Carboxymethylcellulose Calcium、Corn Starch、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Povidone、Talc

【用途(適應症)】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)3歲以下。
 - (二)消化道潰瘍的人。
 - (三)有腎臟疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項：
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。
 - (四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
 - (五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年 齡	劑 量
成人及 12 歲以上	每次 1 錠，一天 3 至 4 次，或需要時服用
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4
3 歲以下	請洽醫師診治

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】 4~1000 粒 塑膠瓶裝

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】 25°C 以下，避光儲存。

【諮詢專線】 0800-005711

衛署藥製字 第 007374 號



信隆藥品工業股份有限公司
 Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
 台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號