固胃皆樂 錠

YSP MACGEL Tablets

制酸劑

作用

在競爭劇烈，生活緊張的工商業社會裡，繁忙的公務與應接不暇的應酬，致使現代人或多或少會有消化不良及胃酸過多等胃腸不適現象，或誘發胃・十二指腸潰瘍。在固胃皆樂錠之雙層錠中分別含有消脹及制酸成分，能緩解脹氣及胃酸過多等不適症狀。

成分

有效成分及含量：每錠中含Aluminum Hydroxide Dried Gel.....200mg
(eq. to Aluminum Hydroxide 153mg)
Magnesium Hydroxide.....200mg
Simethicone.....25mg
（註：單次劑量1錠之酸中和能力大於8mEq，鎂含量6.9mEq）

其他成分（賦形劑）：Silicon Dioxide Colloidal、Mannitol、Microcrystalline Cellulose、Lactose、Allura Red AC、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Polyethylene glycol 6000、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Potato Starch、Sucrose、Sodium Saccharin、Pineapple、L-Menthol、Milk DRY、Corn Starch。

用途（適應症）

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

使用上注意事項

一、有下列情形者，請勿使用：
1.曾因本藥成分引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1.3歲以下。
2.消化道潰瘍的人。
3.腎衰竭病患（長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。）
4.有慢性胃痛的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.與其他藥品併用時。
四、其他使用上注意事項
1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用量。
4.一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
5.製酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

用法用量

年齡	使用量
成人及12歲以上	一天4次，每次1錠，或需要時服用，應嚼碎後吞服。
6歲以上未滿12歲	一天4次，每次1/2錠，或需要時服用。
3歲以上未滿6歲	一天4次，每次1/4錠，或需要時服用。
3歲以下	請洽醫師診治。

警語

一、使用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便祕、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.有任何不適情況產生。
2.連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

包裝

8～1000錠鐵罐裝、塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

類別

醫師藥師藥劑師指示藥品。

保存上之注意

1.本藥應置於小兒伸手不及處。
2.於25°C以下、避光儲存。
3.請在有效期限內使用。

給胃脹氣患者的建議

1.少吃發酵性食物，如麵包等。
2.避免做一切能引起吞嚥空氣的動作，如進食時交談、喝汽水等。
3.喝飲料等液體時應慢慢啜飲，避免大口吞嚥。
4.進餐時應保持心境平和並且細嚼慢嚥。
5.需以藥物治療時，應遵從醫師藥師藥劑生指示，按時正確服藥。
6.適當的服藥雖能提供症狀的部分緩解，但如果症狀仍然持續2～3天以上，就必須找醫師診斷是否患有其它併發性疾病。

MAT 2152207-006
衛署藥製字第030974號

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：(04)26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號