

胃腸抗脹氣制酸劑

“井田” 第 得[®] 錠

TIDO[®] Tablets "Chinteng"

【作 用】：本品有含鋁Aluminum以及含鎂Magnesium hydroxide的兩種制酸劑，可以中和胃酸，以消除胃酸過多的症狀，且較少血液鹼中毒、胃酸逆流(acid reflex)的危險。Activated Dimethicone 能藉由降低氣體表面張力，增加排氣，達到緩解腹部脹氣之效果。

【成 分】：

有效成分及含量：每雙層錠含 (Each Tablet contains)：

Aluminum-hydroxide-magnesium carbonate co-dried gel.....275mg

Magnesium Hydroxide (Milk of magnesia).....100mg

Simethicone (Activated Dimethicone).....25mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Saccharine、Mannitol、Corn Starch、Avicel 102、Potato Starch、Magnesium Stearate、L-Menthol、Orange Powder(B)、Lemon Essence、Sodium Starch Glycolate、Aspartame、Tartrazine、Purified Water.

單次劑量之酸中和能力為9mEq、單次劑量之鎂含量為11.19mEq。

【用途(適應症)】：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣，緩解氣脹相關症狀。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

(二)本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)3歲以下。

(二)消化道潰瘍的人。

(三)有腎臟疾病的人(此藥每日最大建議使用量的含鎂量超過0.6g)

(四)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】：

成人及 12 歲以上	1 日 3 至 4 次，每次 2 錠，或需要時服用，應嚼碎後吞服
6 歲以上未滿 12 歲	每次 1 錠
3 歲以上未滿 6 歲	每次 1/2 錠
3 歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用

【警 語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包 裝】：12~1000錠塑膠瓶裝、玻璃瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類 別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲 存】：本品(塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝)應於25°C以下，避光存放。



PIC/S G.M.P. & 國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

PIC/S G.M.P. T E L: (04) 26814585-7(三線)

諮詢專線: (0800) 461461