

# 洛克飛 顆粒

## Lac-B Granular Powder

Lac-B係經本公司多年研究，在世界上將Bifidus菌初次以工業規模，成功於純培養以及製劑之安定化而成之Bifidus生菌製劑。

從來，母乳營養兒與人工營養兒在臨床上之基本差異一腸管內感染之罹患率、死亡率等一之原因乃在於腸內細菌叢中之Bifidus，尤於母乳營養兒可確認有相當純培養之80~90%之Bifidus菌叢。

Bifidus菌亦存在於成人腸內，尤於老年人其健康者較衰老者大為優勢，因此Bifidus菌不論乳幼兒、老年人或成人均具有相同之生理意義。

### 【成分】

有效成分及含量：每公克中含Lactobacillus bifidus生菌1毫克，亦即Lactobacillus bifidus powder (specially processed) 10毫克。此Bifidus菌係自健康之母乳哺育兒糞便中分離後，經繼代純粹培養而成之Lactobacillus bifidus菌。Bifidus菌，係G(+)；無芽胞之嫌氣性桿菌，為Y字型或球拍型，無運動性，呈乳白色濕潤、圓型之菌集落，白色，略甘之微粒，幾無臭味。

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Lactose。

【用途(適應症)】緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便。

### 【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 對牛乳或乳製品耐受度低的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- (一) 3歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 有發燒症狀時，使用不得超過48小時。

### 【用法用量】

年齡	每次服用劑量	一天服用次數
成人及12歲以上	1~2公克	一天3次，或需要時服用
6歲以上未滿12歲	0.5~1公克	一天3次，或需要時服用
3歲以上未滿6歲	0.3~0.5公克	一天3次，或需要時服用
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治。	

醫師藥師藥劑生指示藥品

### 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	偶有脹氣

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

### 【包裝】

- 一、6~1000包盒裝，每包1公克。
- 二、6~500包盒裝，每包2公克。

【儲存條件】25°C以下乾燥處。

製造廠：KOWA COMPANY, LTD.  
No. 21-1, Matsuyama-cho, Mohka, Tochigi, Japan  
分裝工廠：順華藥品工業股份有限公司三峽工廠  
新北市三峽區二關路186號  
藥商：宜泰貿易有限公司  
台北市重慶南路三段36巷12號

DSC-11  
LBP-003