

寧庖寧 敏感止癢乳膏

外用

080 Migan Antiitching Cream

本品所含成分包括：抗過敏、消炎、止痛、止癢、消腫之作用，而藥膏本身具水溶性，塗敷於各種皮膚炎症，如紅腫、癢痛、灼熱感等過敏性或蚊蟲咬傷、外傷刺激引起之發炎症狀之治療和緩解有其效果。

【成分】：有效成分及含量：

Each gm contains:

Lidocaine Hydrochloride30.00mg

Prednisolone Acetate.....1.25mg

Chlorpheniramine Maleate.....10.00mg

Chlorhexidine Hydrochloride.....2.00mg

其他成分(賦形劑)：

Methylparaben, Propylparaben, Cetyl alcohol, Propylene glycol, Mineral oil, Glyceryl monostearate, Sodium bisulfite, Aloe vera powder(200:1), Edetate disodium, Potassium phosphate monobasic, Calendula extract, Horse-chestnut extract, Glycyrrhiza extract liquid, Behenyl alcohol, Sodium phosphate monobasic anhydrous, Beeswax white, Ethanol, Polyethylene glycol monostearate 45EO, Fragrance 245-800, Water Purified.

Methyl Salicylate20.00mg

Camphor.....5.00mg

Menthol.....5.00mg

【用途(適應症)】：搔癢、皮膚炎、皮膚感染、蚊蟲咬傷、濕疹、汗疹、蕁麻疹、斑疹、燙傷、凍傷。

【使用上注意事項】：

●有下列情形者，請勿使用

1. 對本藥各成分過敏者。
2. 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

●有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 皮膚深層感染的地方，請就醫治療。

●有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 2歲以下兒童。
2. 孕婦及哺乳婦。
3. Methyl salicylate 之每日用量不得超過 1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象。

●其他使用上注意事項

1. 放在兒童無法拿到的地方。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
4. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜(生殖道、口腔內皮、鼻腔、眼球表面等地方)。
5. 本藥勿使用於大面積(大於使用者兩個手掌的面積)之體表或皮膚深部感染。
6. Methyl salicylate 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。
7. 使用皮膚外用藥後，不可用衣物、紗布或其他醫療品覆蓋，以免增加副作用。
8. 類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過兩星期。連續使用超過三星期時，有增加過敏性接觸性皮膚炎之虞。
9. 塗抹皮膚外用藥後請徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 兒童長期使用較易引起庫欣氏症候群(月亮臉、水牛肩、多毛、情緒不穩定等症狀)及腎上腺功能障礙。
11. 癬類或其他皮膚感染症狀，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
12. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚變薄。
13. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他的皮膚炎區分，誤用類固醇類抗發炎劑會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
14. 不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。

【用法用量】：一日數次，適量塗於患處。

【警語】：

●使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
全身	滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴、繼發性腎上腺功能不足、無力、體重減輕、低血壓
皮膚	局部灼熱、刺傷、偶有過敏性反應、搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕熱、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張
胃腸道	噁心嘔吐、食慾不振、腹痛、便秘、腹瀉

●使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

【包裝】：1000 公克以下鋁管、塑膠盒裝。

PIC/S GMP 優良藥廠

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 039941 號

【儲藏條件】：25℃ 以下保存，避免日光直射及受潮。

www.080beautyclub.com.tw

經銷商：救人實業股份有限公司

藥商及製造廠：澳斯麗國際股份有限公司 淡水廠

地址：台北市萬華區洛陽街 9 號 9 樓之 1

地址：新北市淡水區北新路三段 123-1 號

