

滴可明 眼用凝膠劑

Corneregel

衛署藥輸字第021271號

【成分】

有效成分及含量: 每公克含Dexpanthenol 50 mg

其它成分(賦形劑): Cetrimide, Carbomer, Sodium hydroxide, Disodium edetate, Water for injection.

【用途(適應症)】

結膜炎、角膜炎、麥粒腫、結膜充血。

【使用上注意事項】


- 有下列情形者，請勿使用：
對本藥任何成分過敏者。
- 其他使用上注意事項：
 1. 縱使照指示給藥，本品可能有暫時性的視覺模糊，故駕車與操作機器者應注意。
 2. 使用眼藥水與藥膏時，請先使用藥水，間隔5分鐘以上再用藥膏。
 3. 超過保存期限或藥液混濁、變色或出現異物時，請勿使用。
 4. 開瓶28天(四週)後請勿繼續使用。
 5. 為避免汙染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 6. 為防止兒童誤食，請妥善保管，置於兒童接觸不到的地方。
 7. 儲存於25℃以下，避免陽光直射。

【用法用量】


醫師藥師藥劑生指示藥品

一般情況	每天3-5次，每次一滴，滴入結膜囊內
其它情況	經醫師指示依病情嚴重程度增減使用次數。
戴隱形眼鏡者	點眼時請將隱形眼鏡取下


【使用步驟】



1. 先將凝露擠壓出管口一小滴



2. 兩指將眼睛撐開，垂直點入眼角後，轉動眼球使均勻分佈



3. 將瓶子蓋緊後垂直放好

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 若有任何耐受不良或不適情況產生。
- 連續使用三天症狀沒有改善。
- 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或發紅、腫、熱、刺激感。

【包裝】

5和10公克管裝。

製造廠：Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH

廠址：Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

藥商：武昌貿易有限公司

地址：台北市南京西路13號8樓

諮詢專線：0800-251-197