



Verso

9 mm

115 mm

使用/操作指示

1. 請勿剪切噴嘴。此定量噴霧器在使用前已經是隨時可用的狀態。



2. 清潔鼻腔。

3. 打開瓶蓋。

4. 在第一次使用歐治鼻薄荷前，請先按壓4次，直到噴出均勻的藥水為止。後續用藥時，噴霧幫浦都可立即使用。如超過六天未使用，於使用前請先按壓4次。請特別小心不要噴入眼睛或口腔。

5. 以拇指頂在藥瓶底部及兩隻手指夾住噴嘴的方式直立握住藥瓶。



6. 頭部微向前傾斜並將噴嘴插入鼻孔。

7. 按壓噴頭，同時用鼻子輕輕吸氣。



8. 在另一鼻孔重複相同的步驟。

9. 使用後立即清潔噴嘴，待乾燥後蓋好瓶蓋。

10. 為避免感染散播，此噴霧劑僅可由同一人使用。

警語

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	血管性水腫、皮疹、搔癢
神經系統	頭痛
眼睛	視覺模糊
心臟	心律不整、心跳加速
呼吸道	鼻腔乾燥、不適
胃腸道	噁心
其他	投藥部位灼熱感

如果您有以上未列出的其他副作用，請告訴您的醫師或藥師。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

(1)若有任何不適情況產生。

(2)若有以下過敏的情況：

●呼吸或吞嚥困難

●面部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹

●皮膚瘙癢、紅疹或隆起

(3)使用過量，或使用後出現下列症狀：嚴重暈眩、冒汗、體溫嚴重下降、頭痛、心搏徐緩、高血壓、呼吸抑制和昏迷。高血壓之後可能會接著發生低血壓。

(4)會對擬交感神經劑產生強烈反應的人，或使用後出現下列症狀：失眠、昏眩、顫抖、心律不整或血壓升高等徵兆。

(5)若持續使用本藥一周後，症狀沒有改善或加重。

包裝

100毫升以下塑膠瓶裝。

儲存條件

放在原包裝內，25°C以下乾燥處，避光避熱保存。

PIL 20131031

72 mm

Pharma code 1747

210 mm



製造廠：Novartis Consumer Health SA

廠址：Route de l'Etraz 1260 Nyon, Switzerland

藥商：英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司

台灣分公司

地址：台北市忠孝西路一段66號24樓

諮詢專線：0800-212259

Otrivin及歐治鼻為葛蘭素史克集團所有或經授權的商標

©2016 GSK group of companies. All rights reserved.

修訂日期：2016年10月

145 mm