"**汗**唐" **淨咳痰** 類粒 (伊普拉辛隆)

鎮咳祛痰劑

Desplen granules (Eprazinone) 衛署藥製字第025442號

本藥作用於大腦的咳嗽中樞,鎮咳效果優於 Codeine與Dextromethorphan HBr,並能降低支 氣管黏液的黏稠度,同時具有鎮咳、祛痰雙重作 用。

成分

有效成分及含量(每克含):

Eprazinone dihydrochloride 100 mg 其他成分(賦形劑):Sucrose、Orange powder、 Saccharin soluble、Tartrazine aluminum lake、Povidone。

用途(適應症)

下列呼吸器疾患之鎮咳祛痰(肺炎、支氣管擴張症、支氣管氣喘、急慢性支氣管炎)。

⚠ 使用上注意事項

- 、有下列情形者,請勿使用:
- (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治:
- (1) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫) 所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的
- 三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項:
 - (1) 為防止兒童誤食, 本藥請妥善保管。
 - (2)避免陽光直射。
 - (3) 勿超過建議使用量。
 - (4) 不得與洒糖飲料併用。

如對產品在使用上有任何疑問, 少本公司專業藥師將竭誠為您服務 諮詢專線

服務時間 8:00~17:00 例假日除外) 網址 http://www.yuanchou.com.tw

用法用量

年齡	一日量	服用次數
成人	0.6-0.9g	
6-9歳	0. 3-0. 45g	
3-5歲	0. 2-0. 3g	一日分3次服用
1-2歲	0.1-0.2g	
未滿1歲	0.05-0.1g	

添附1公克量匙

▲警語

一、服用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用	
消化系統	食慾不振、嘔吐、胃部不適	

- 二、服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
- (1) 若有任何不適情形產生。
- (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛,及持續達一星期以上的咳嗽,或有復發情形。

包裝

100克、500克、1000克塑膠瓶裝。

湘 민

醫師藥師藥劑牛指示藥品。

儲存

25℃以下儲存。





元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路272號