


正.確.用.藥.好.簡.單.

# 可待因止咳藥水

Codeine



# 超級大富翁

## 現場直播

懶視



請問以下一家人，何者不適合服用可待因止咳藥水？

- (1)爸爸 (2)在哺乳的媽媽 (3)哥哥(15歲)  
(4)妹妹(1歲) (5)視情況酌量或禁止使用



同款丟無同師傅，可待因到底是什麼？

使用 **CALL OUT**！  
打給食藥署及年輕藥師協會！！





# 什麼是可待因？



Codeine

\* 具有止咳、止瀉、止痛的作用

\* 嗎啡的類似物、鴉片中的成分之一



因長期服用易有**成癮性**，被歸類為第二級管制藥品

但!!!不要驚慌!!!!**低劑量可待因**  
( $<1.0\text{g}/100\text{g}$ ,  $<0.1\text{g}/100\text{ml}$ )  
可用於非處方藥品，可短期使用  
於緩解咳嗽症狀喔！

# 可待因可能有甚麼副作用？





易嗜睡、頭暈，服用後開車或操作危險器械應特別小心



動物實驗有畸胎案例，孕婦使用應謹慎評估

長期使用可能會產生依賴性，使用時應注意觀察



注意呼吸相關不良副作用，例如呼吸緩慢或微弱、呼吸困難、呼吸聲嘈雜、意識混亂、異常嗜睡或癱軟等

# 可待因使用上的注意事項



## 含可待因的止咳處方藥品

須經醫師診治後才可使用

12至18歲  
具呼吸功能不全的兒童

須謹慎使用

未滿12歲兒童

應確實評估使用的必要性，且應依年齡減量使用

哺乳婦女

禁止使用

## 含可待因的止咳非處方藥品

12至18歲  
具呼吸功能不全的兒童

需經醫師診治後才可使用

未滿12歲兒童

禁止使用

哺乳婦女

禁止使用

其他如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼吸道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，應經醫師診治後處方使用。



# 哪些人使用可待因止咳藥水要特別注意


未滿18歲  
之兒童

孕婦

哺乳婦女

年長者

部分日本感冒藥品也含有可待因成分，使用前務必先檢查喔!!!





咳嗽時，要先知道病因，  
並給予治療，避免一直忽略不理。

若咳嗽長達一個月以上，  
應就醫進一步檢查。

答案是(5)  
依照每個人的情況斟酌使用





# 超級大富翁

## 現場直播

標準答案!

懶視

請問以下一家人，何者不適合服用可待因止咳藥水？

- (1)爸爸 (2)在哺乳的媽媽 (3)哥哥(15歲)  
(4)妹妹(1歲) (5)視情況酌量或禁止使用



# 正確用藥好簡單



## 3 要 2 不！

### 要知風險

所有藥品都有風險

### 要問藥師

購買藥品時與藥師討論使用方式

### 要看標示

使用前看清楚外盒及說明書的指示

### 不過量

依照說明書的使用方式

### 不輕忽

3天以上症狀未改善，需盡速就醫



# 台灣年輕藥師協會

Taiwan Young Pharmacist Group

製作



## FDA 食品藥物管理署

Food and Drug Administration

監製

若有任何問題可以至購買藥局或  
各地區的社區用藥諮詢站  
詢問親切的藥師唷