

正.確.用.藥.好.簡.單.

牙齒與口腔局部止痛劑

Benzocaine 止痛成分





媽媽，我牙齒痛痛

沒事沒事，應該只是長牙的關係
噴點藥局買的止痛藥水就沒事了喔～



媽媽，我牙齒痛痛

長牙的關係
藥水就沒事了喔～

以上行為，若是未諮詢過醫師或藥師
可是會被NG的噢



為什麼這是一個NG的行為呢？

市面上有許多用於牙齒、牙齦或喉嚨疼痛時使用的局部止痛藥水、凝膠等

家長們會想購買來給小朋友的長牙痛、嘴破等症狀使用

但是！！

這些藥劑都常含有 **Benzocaine**
此種有局部止痛作用的成分。
而這種成分不建議使用在孩童！！！！




Benzocaine到底是什麼？

Benzocaine 若使用在幼兒
有發生 **高變性血紅蛋白血症** 的風險

Methemoglobinemia

高變性血紅蛋白血症是一種少見但危險性高的症狀。
血液中正常的紅血球會變性成無法攜帶氧氣的紅血球 (Methemoglobin)



當這樣的現象出現時，病人會出現以下症狀

發紺

焦慮

虛弱

頭痛

心跳過速

呼吸困難

如果情況持續沒有改善，則有導致**死亡**的風險！

使用 Benzocaine 之注意事項

使用前

禁止使用

- 2歲以下嬰幼兒
- 對此藥過敏者

醫生診治後 才可以使用

- 2~12歲孩童

使用時


注意事項

- 保管在兒童無法自行取得之處
- 於患部少部分使用，禁止大面積使用
- 依照藥品使用說明，使用期間有不適或是任何疑問都要儘速洽詢醫師或藥師

使用 Benzocaine 之注意事項

使用後

若有任何不適，例如



有以上任何一種狀況都請立即停止使用，並尋求醫師診治

孩童發生牙痛或口腔受傷時該如何處理呢？



長牙疼痛

- 用潔淨過的手輕輕按摩
- 為孩童準備合格的橡膠成長咬合器



其他牙齒症狀

- 吃完食物或喝奶後用紗布或軟毛牙刷清潔
- 定期接受牙齒檢查
- 依照牙醫師建議治療或保健



其他口腔內傷口

- 大多數傷口都會於一週內癒合
- 如傷口超過一週未癒合，須由醫師診治



正確用藥好簡單



3 要 2 不!

要知風險

所有藥品都有風險

要問藥師

購買藥品時與藥師討論使用方式

要看標示

使用前看清楚外盒及說明書的指示

不過量

依照說明書的使用方式

不輕忽

3天以上症狀未改善，需盡速就醫



台灣年輕藥師協會

Taiwan Young Pharmacist Group

製作



FDA

食品藥物管理署

Food and Drug Administration

監製

若有任何問題可以至購買藥局或
各地區的社區用藥諮詢站
詢問親切的藥師唷