



能奔[®]注射劑

Nepexto[®] Solution for Injection

本品Nepexto[®]為Enbrel[®]的生物相似藥品

衛部菌疫輸字第001180號

本藥限由醫師使用

警語

可能會增加侵入性黴菌感染之風險。

兒童及青少年使用抗腫瘤壞死因子製劑(anti-tumor necrosis factor (TNF agents) (etanercept)可能會增加淋巴瘤(lymphoma)及其他癌症風險。

1. 產品名稱

能奔[®]注射劑

2. 定性及定量組成

每支預先充填的注射劑含有25毫克或50毫克的etanercept。

Etanercept為人類腫瘤壞死因子接受體p75Fc的融合蛋白質，經由基因工程技術獲自中國黃金鼠卵巢(CHO)之哺乳表現系統。Etanercept是一個嵌合體蛋白質的二聚體，是以基因工程融合細胞外人類腫瘤壞死因子接受體-2(TNFR2/p75)的配位體結合部位至人類IgG1的Fc部位。Etanercept含有934個胺基酸，分子量約為150 kilodaltons。組成etanercept的Fc包含有CH₂、CH₃及鏈結部位，但不包括IgG1之CH₁部分。Etanercept的專一活性為1.7x10⁶單位/毫克。賦形劑請見6.1。

3. 劑型

供注射用的溶液。

該溶液為澄清、無色至乳白色或淡黃色，配製於pH 6.3±0.2。

溶液的滲透壓為310±30 mOsm/kg (請見6.5)。

4. 臨床特性

4.1 適應症

適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物 (即DMARDs，包括methotrexate) 無適當療效之成人活動性類風濕性關節炎。

也適用於先前未使用methotrexate治療之成人中度至重度活動性類風濕性關節炎。這些病人的X光檢查顯示，etanercept可以減緩疾病造成的關節結構性受損。

亦適用於methotrexate治療無效或無法耐受的2歲以上兒童及青少年的活動性多關節幼年型慢性關節炎。尚未對不足2歲的兒童進行試驗。

適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物無療效之成人活動性與進行性乾癬性關節炎。

治療活動性僵直性脊椎炎。

適用於對其他全身性治療（包括cyclosporine、methotrexate或光化療法（PUVA））無效、有禁忌或無法耐受之中度至重度乾癬成人病人（見5.1節）

適用於對其他全身性治療或光化療法無法有效控制或無法耐受之6歲以上兒童及青少年的重度乾癬。

4.2 用法用量

Nepexto的治療應在有經驗的專科醫師監督下進行對類風濕性關節炎、幼年型慢性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬或幼年乾癬之診斷及治療。

成人（18-64歲）

類風濕性關節炎

Nepexto的建議劑量為每次25毫克，每週二次。亦可以每週給予一次50毫克的方式治療，同樣具有可靠的療效與安全性（見5.1節）。

乾癬性關節炎與僵直性脊椎炎

Nepexto的建議劑量為25毫克，每週二次。也可以每週給予一次50毫克的方式治療。

針對上述所有適應症，現有資料顯示通常會在12週內達到臨床反應。此時間內無反應病人，應審慎考量是否適合繼續治療。

乾癬

Nepexto的建議劑量為25毫克，每週二次，但亦可每週給予一次50毫克的方式治療。亦可選擇先以每週兩次給予50毫克，持續給予達12週後，再調整為25毫克，每週二次，或每週給予一次50毫克的方式治療。應持續（最多24週）Nepexto的治療以達到症狀緩解。若病人使用12週後對藥物沒有反應則應停藥。

如以Nepexto再度治療，應遵照上述之用法用量治療。其劑量應為25毫克，每週兩次，但亦可每週給予一次50毫克的方式治療。

特殊族群

孩童

此劑型的Nepexto為單一次使用針筒，適用於體重62.5公斤或以上的兒童病人。Nepexto僅提供25毫克或50毫克預充填注射針筒以及50毫克預充填注射筆的劑型，因此Nepexto不適用於所需劑量小於25毫克或50毫克的兒童病人。由於etanercept的兒童建議劑量是以病人的體重計算而得，對於體重不足62.5公斤的兒童病人，應使用凍晶注射劑型的其他etanercept藥品，並以「毫克/公斤」為基礎準確計算投與劑量。

活動性多關節幼年型慢性關節炎(2歲以上)

投與0.4毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為25毫克)，每週二次，皮下注射，劑量間之投藥間隔為3-4天；或0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次。病人在使用四個月後沒反應則應考慮停藥。

針對2到3歲的兒童沒有進行正式的臨床試驗。然而從紀錄中病人有限的安全性資料說明在每週每公斤使用皮下注射0.8毫克的2到3歲兒童之安全性是相似於四歲以上的兒童和成年人。(參見5.1節)

Nepexto並不適用於未滿2歲的活動性多關節幼年型慢性關節炎。

幼年乾癬(6歲以上)

投與0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次，至多24週。如果病人使用12週後對藥物沒有反應，則應停藥。

如以Nepexto再度治療，應遵照上述之用法用量治療。其劑量應為0.8毫克/公斤的劑量(每次最大劑量為50毫克)，每週一次。

Nepexto並不適用於未滿6歲的幼年乾癬。

老年人

無需調整劑量。用法用量與18-64歲成人相同。

腎臟及肝臟功能受損病人

無需調整劑量。

用藥方式

Nepexto採皮下注射方式給藥(參見6.5節)。

完整用藥指示請參見第7節

4.3 禁忌

對本藥中的活性成分或列於6.1節中任何賦形劑過敏者。

敗血症或有敗血症危險者。

Nepexto的治療不可用於有活動性感染(包括慢性及局部感染)的病人。

4.4 特別警語與注意事項

感染

在開始接受Nepexto治療前、治療期間及治療後，都應為病人進行感染症的篩選；etanercept的平均排除半衰期約為70小時(範圍為7-300小時不等)。

使用etanercept曾發生嚴重的感染、敗血症、結核病、或伺機性傳染包括侵入性黴菌感染的疾病、李斯特菌症及退伍軍人症(參見4.8)。這些感染是由細菌、分枝桿菌、黴菌、病毒與寄生蟲(包括原蟲)所引起。在某些案例，某些特殊黴菌與其他伺機感染尚未被診斷出來，而導致延誤治療，有時甚至死亡。在評估病人的感染情況時，亦需考慮病人其他伺機性感染(例如：暴露於地區黴菌病)的風險。

接受Nepexto治療的病人如果發生新的感染，應予以嚴密的監測。如果病人發生嚴重的感染，應中止Nepexto治療。慢性感染病人使用etanercept的安全性與療效尚未評估，所以醫師在考慮使用Nepexto於有復發性或慢性感染病史或有潛在因素而容易感染的病人(如血糖失控或不易控制的糖尿病人)時，應特別小心。

結核病

曾有病人使用etanercept後感染包括粟粒狀結核病及病灶在肺部以外的結核病。

所有病人在接受Nepexto治療前都應先進行活躍型與非活躍型（潛伏性）結核病的篩檢，這項評估的內容包括個人的結核病詳細病史、可能的接觸病史、過去及/或現在接受免疫抑制劑治療的經過等，並建議病人應先接受適當的結核病篩選檢查，例如結核菌素皮膚測試及胸部X光檢查（依病人生活所在當地衛生主管機關建議決定是否所有的病人都要安排完整的結核病篩檢檢查）。接受結核菌素皮膚篩檢時，可能會出現偽陰性的結果，尤其發生於有嚴重疾病或免疫機能不全的病人。

Nepexto禁止使用於活躍型結核病人；非活躍型（潛伏性結核病人）則應在開始Nepexto療程前，先接受經衛生主管機關認可的抗結核病藥物治療，以控制其非活躍型結核病，並對於結核病人使用Nepexto的利弊，應先進行審慎的評估。

病人在使用Nepexto治療期間，若有出現疑似結核病病徵時（例如持續性咳嗽、體力耗損/體重減輕、輕微的發燒等），這些病人都應立即尋求醫療協助。

B型肝炎活化

已有先前曾感染B型肝炎病毒(HBV)並同時接受etanercept等TNF拮抗劑治療的病人，發生B型肝炎活化的案例報告，這些案例包括B型肝炎核心抗體(anti-HBc)陽性但B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性的病人。在開始以Nepexto治療前，病人應先接受B型肝炎篩檢。對於確認為HBV感染病人，建議諮詢有B型肝炎治療經驗的醫師。以Nepexto治療先前曾感染B型肝炎病毒的病人時，應謹慎留意病人的狀況。在整個治療期間以及治療結束後數個月，應監測病人B型肝炎病毒活化的症狀與徵兆。目前尚無對B型肝炎病人同時使用抗病毒療法及TNF拮抗劑治療的相關數據。病人發生HBV感染時，應停止使用Nepexto，並開始給予有效的抗病毒治療及適當的支持療法。

C型肝炎的惡化

曾有C型肝炎病人接受etanercept治療時，發生C型肝炎病情惡化的案例報告。有C型肝炎病史的病人使用Nepexto時應小心。

與anakinra合併治療

相較於單獨使用，etanercept與anakinra併用會增加嚴重感染與嗜中性白血球減少症的風險。兩種藥物的結合臨床上未顯示增加療效，所以不建議併用Nepexto與anakinra（參見4.5與4.8節）。

與abatacept合併治療

在原開發廠藥品之臨床試驗中，abatacept與etanercept合併使用會導致嚴重副作用的發生率增加。兩者併用尚未證實可增加臨床效益，因此並不建議兩者併用（參見4.5節）。

過敏反應

常見與etanercept治療的過敏反應報告，包括血管性水腫、蕁麻疹以及其他嚴重反應。如果發生任何過敏反應，應立刻中止Nepexto的治療並給予適當處置。

免疫抑制

因為TNF可調節發炎及細胞免疫反應，所以包括etanercept在內的抗TNF治療，可能會影響宿主對抗感染及惡性腫瘤的作用。在一個49位接受etanercept治療類風濕性關節炎病人的原開發廠藥品之臨床實驗中，並未發現延遲性過敏抑制、免疫球蛋白濃度抑制或一系列反應細胞族群改變的證據。

二位幼年型慢性關節炎的病人曾發生水痘感染及無菌性腦膜炎症狀，現已治癒且無後遺症。高度暴露於水痘病毒的病人應暫時停止Nepexto的治療，並應給予水痘帶狀疱疹免疫蛋白之預防性治療。

尚未評估etanercept使用於免疫抑制或慢性感染病人的安全性及有效性。

惡性腫瘤及淋巴組織增生疾病

實體及造血惡性腫瘤

在etanercept上市期間，已有各種不同的惡性腫瘤（包括乳癌、肺癌與淋巴瘤）之案例報告（參見4.8節）。

在TNF拮抗劑的對照性臨床試驗中，接受TNF拮抗劑治療並出現淋巴瘤的發生率高於對照組。但實際上淋巴瘤的發生率極少，且對照組的追蹤期相對較短。在上市後，使用TNF拮抗劑的病人曾有發生白血病的報導。對於長期存在活躍型發炎疾病的類風濕性關節炎病人，其發生淋巴瘤及白血病的基礎風險會增高。

依目前對TNF拮抗劑特性的了解，亦不能排除病人接受TNF拮抗劑治療可能發生罹患淋巴瘤、白血病或其他造血或實體惡性腫瘤的風險。對於曾罹患惡性腫瘤病人考慮使用TNF拮抗劑或罹癌病人當考慮持續使用時應小心。

在上市後，曾有兒童、青少年與青年(至多22歲)使用TNF拮抗劑(起始治療的年紀等於或小於18歲)包括etanercept罹患惡性腫瘤，有些導致死亡的報導。有一半案例是淋巴瘤，其他是各種不同惡性腫瘤，包括因免疫抑制而引起的罕見惡性腫瘤。兒童與青少年使用TNF拮抗劑而引發惡性腫瘤的風險不可排除。

皮膚癌

使用TNF拮抗劑的病人曾有罹患黑色素瘤及非黑色素瘤皮膚癌的報導。在上市後，曾有使用Etanercept的病人罹患牟克耳氏細胞瘤(Merkel cell carcinoma)的報導。對於所有使用Nepexto的病人，特別是有罹患皮膚癌風險的病人，建議應定期作皮膚檢查。

綜合原開發廠藥品之對照性臨床試驗的結果發現，使用etanercept的病人比對照組病人，特別是乾癬病人，發生非黑色素瘤皮膚癌的案例較多。

疫苗接種

活體疫苗不可與Nepexto併用。目前尚無接受etanercept治療的病人在接受活體疫苗接種後造成二次傳播感染的數據。在一項共有184位乾癬性關節炎病人參與的雙盲對照性隨機之原開發廠藥品臨床試驗中，以etanercept治療第4週時，同時給予病人接種一劑多價性的肺炎鏈球菌多醣類疫苗。在這試驗中，大部分乾癬性關節炎病人接受etanercept治療的病人B細胞都能對肺炎鏈球菌多醣類疫苗產生有效的免疫反應，但相對未接受etanercept治療的病人，接受etanercept治療的病人產生的整體免疫效價稍微偏低，另有少數病人的效價則比未接受etanercept治療的病人高出2倍。目前仍不清楚這項臨床試驗代表的意義。

自體抗體的形成

Etanercept治療可能會造成自體免疫抗體的產生(見4.8節)。

血液反應

以etanercept治療的病人曾發生罕見的全血球減少症及非常罕有再生不良性貧血，有些甚至因而死亡。因此使用Nepexto於先前曾患有血液性失調的病人，應特別小心。應告知所有的病人，在以Nepexto治療期間，如果發生血液性失調或感染的徵兆與症狀(例如：持續發燒、喉嚨痛、淤傷、出血及臉色蒼白)應立即就醫，並應立即對這些病人進行緊急檢測，包括全血球數目；如果確認有血液性失調現象，應中止Nepexto治療。

神經系統失調

罕見在以etanercept治療的病人發生中樞神經去髓鞘性失調的案例報告(見4.8節)。此外，也有罕見末梢去髓鞘多發性神經病變(包括Guillain-Barré症候群、慢性發炎去髓鞘多發性神經病變、去髓鞘多發性神經病變與多病灶運動神經病變)。雖然目前尚未進行臨床試驗用以評估etanercept對於多發性硬化病人的影響，但是其他TNF拮抗劑作用於多發性硬化病人的臨床試驗結果顯示，會增加疾病的活性。因此建議在開立處方於曾患有或最近發生去髓鞘症狀的病人時，應小心評估其風險及效益。

併用治療

以類風濕性關節炎病人為對照組之二年期原開發廠藥品臨床試驗，etanercept與methotrexate合併治療並無預期外的安全性發現，且etanercept與methotrexate合併使用的安全性資料與單獨使用etanercept、methotrexate的試驗報告相似。兩者合併使用的安全性評估長期試驗則持續進行中。目前尚未建立etanercept併用其他疾病緩解型抗風濕性藥物之長期安全性資料。

尚無etanercept與其他全身性治療或光照治療併用於治療乾癬之長期安全性資料。

腎臟及肝臟功能受損病人

依據藥動學資料(見5.2節)，對於腎臟或肝臟功能不良的病人無需調整劑量。對於這些病人的臨床使用經驗目前仍有限。

充血性心臟衰竭(鬱血性心臟衰竭)

對於有充血性心臟衰竭的病人，醫師應小心使用Nepexto。有病人使用etanercept後發生充血性心臟衰竭(congestive heart failure)惡化的上市後案例報告(包含具有與不具有鑑別誘發因子)。也有一些新發作的充血性心臟衰竭的罕見(<0.1%)報告，包括沒有已知預先存在心血管疾病的病人。其中一些病人為50歲以下。兩個大型原開發廠藥品臨床實驗評估etanercept使用於治療充血性心臟衰竭，因不具功效而提前終止。雖然試驗沒有結果，但其中一份資料建議，etanercept的治療可能對充血性心臟衰竭的病人有惡化的傾向。

酒精性肝炎

在48位使用etanercept或安慰劑治療中到重度酒精性肝炎之住院病人的第二期隨機安慰劑為對照原開發廠藥品之臨床試驗發現，etanercept不具治療效果，同時使用etanercept的病人，其死亡率在6個月後會有意義地增高。因此，Nepexto不應用於治療酒精性肝炎。醫師使用Nepexto治療同時亦罹患中到重度酒精性肝炎病人應小心。

韋格氏肉芽腫(Wegener's Granulomatosis)

在一項原開發廠藥品之臨床對照試驗中，有89位病人除了以標準療程(包括以皮質類固醇及cyclophosphamide或methotrexate等藥物)治療外，並再接受etanercept治療，平均療程為25個月；研究結果顯示etanercept對韋格氏肉芽腫並不具有療效；此外，病人接受etanercept治療而發生各種非皮膚性惡性腫瘤的機率明顯高於對照組。因此不建議罹患韋格氏肉芽腫的病人接受

Nepexto治療。

糖尿病病人之低血糖

曾有報導接受糖尿病治療的病人使用etanercept發生低血糖的報導，因此，對於某些糖尿病病人需要降低降血糖藥的劑量。

特殊族群

老年人

在治療類風濕關節炎、乾癬性關節炎與僵直性脊椎炎的第三期原開發廠藥品之試驗中，65歲或以上病人使用etanercept治療無論在不良反應、嚴重不良反應與嚴重感染方面，和較年輕的病人相較，整體上沒有差別。但是，在治療老年人時應小心，對於併發感染的病人應特別小心。

孩童

疫苗接種

如果可能，建議幼年型病人在接受治療前，應依據現行預防接種的基準，完成當時所需之所有免疫接種。

幼年型慢性關節炎病人之發炎性腸疾病和葡萄膜炎

幼年型慢性關節炎病人使用etanercept曾有發生發炎性腸疾病和葡萄膜炎的報導(見4.8節)。

4.5 與其他藥品與劑型之交互作用 (以下段落來自etanercept原開發廠藥品之臨床試驗數據)

與anakinra合併治療

相較於etanercept或anakinra單獨使用，兩者併用會增加嚴重感染的風險(歷史資料)。此外，一雙盲、安慰劑對照組、以目前正接受methotrexate治療的病人為試驗對象，結果顯示，etanercept或anakinra兩者併用會比單獨使用etanercept增加嚴重感染(7%)與嗜中性白血球減少症的風險(見4.4與4.8節)。併用兩種藥物在臨床上未顯示增加療效，所以不建議能奔(Nepexto)與anakinra併用。

與abatacept合併治療

在臨床試驗中，abatacept與etanercept合併使用會導致嚴重副作用的發生率增加。兩者併用尚未證實可增加臨床效益，因此並不建議兩者併用(參見4.4節)。

與sulfasalazine合併治療

臨床試驗中的病人若已接受基本的sulfasalazine療程治療時，若再加上etanercept合併治療，平均白血球數量會明顯低於僅接受sulfasalazine或etanercept治療的病人。目前仍不清楚這個現象的臨床意義。醫師在考慮併用sulfasalazine時應小心。

無交互作用

臨床實驗觀察結果顯示，etanercept與糖皮質激素類(glucocorticoids)、水楊酸類(salicylates)及非類固醇類抗發炎劑(NSAIDs)、麻醉劑及methotrexate不具交互作用。疫苗接種的建議請參見4.4節。

Etanercept與methotrexate、digoxin或warfarin併用時，並沒有顯著的臨床藥物動力學交互作用。

4.6 生育、懷孕與哺乳

有生育潛力的婦女

應建議有生育潛力的婦女在使用Nepexto治療期間與停藥3週內應採取適當的避孕措施以避免懷孕。

懷孕

在大鼠及兔子的發育毒性實驗中，並未發現etanercept傷害大鼠胎兒或新生兒的證據。目前已在兩項原開發廠藥品之觀察性世代研究中探討etanercept對懷孕結果的影響。在其中一項原開發廠藥品之觀察性研究中發現，相較於在懷孕期間沒有暴露於etanercept或其他TNF拮抗劑的懷孕婦女（n = 164），懷孕前三個月中暴露於etanercept的懷孕婦女（n = 370）發生重大先天缺陷的比率較高（調整勝算比2.4，95% CI:1.0-5.5）。重大先天缺陷的類型和一般族群最常報告的類型一致，且沒有異常的特定模式。自然流產、胎死腹中或輕微畸形的比率沒有觀察到變化。另一項原開發廠藥品之觀察性多國登錄試驗比較在懷孕的前90天中暴露於etanercept之婦女（n = 425）與暴露於非生物製劑藥物之婦女（n = 3497）的不良懷孕結果風險，並未觀察到重大先天缺陷風險上升情形（粗勝算比[OR] = 1.22，95% CI:0.79-1.90；在校正國別、母親疾病、胎次、母親年齡和懷孕早期吸菸因子後之調整勝算比 = 0.96，95% CI:0.58-1.60）。此試驗也顯示在懷孕期間暴露於etanercept的婦女發生輕微先天缺陷、早產、胎死腹中或新生兒在出生後第一年內發生感染之風險並未增加。懷孕期間使用Nepexto應僅限於有明確需求時。

Etanercept會通過胎盤，懷孕期間接受etanercept治療的婦女，產下的嬰兒血清中曾測到etanercept。此部分的臨床影響未知，但可能提高嬰兒受到感染的風險。一般來說，母親投與最後一劑Nepexto後未滿16週前，建議不要為嬰兒接種活疫苗（live vaccines）。

哺乳婦女

有皮下給予etanercept後，etanercept分泌於人類乳汁的報告。哺乳的大白鼠皮下給予etanercept時，etanercept會分泌到乳汁，且幼鼠的血漿能偵測到etanercept的濃度。由於免疫球蛋白（常見於許多醫藥品）會分泌於人類乳汁中，因此欲使用能奔（Nepexto）於哺乳期間的婦女時，在衡量哺乳的好處與哺乳婦女治療的益處時，應考量是否停止哺乳或停藥。

生育

Etanercept對分娩前後的毒性，以及對生殖力與一般生育力的作用，目前並無臨床前實驗數據。

4.7 對開車及操作機器能力的影響

目前尚未進行是否影響開車及操作機器能力的研究。

4.8 不良反應（以下段落來自etanercept原開發廠藥品之臨床試驗數據）

安全性概述

最常見不良反應是注射部位反應（包括注射部位疼痛、腫脹、癢、發紅與流血），感染（如上呼吸道感染，支氣管炎，膀胱感染與皮膚感染），過敏反應，自體抗體生成，癢與發燒。

使用etanercept亦有嚴重不良反應的報導。TNF拮抗劑，如etanercept會影響免疫系統，使用etanercept可能會影響身體對感染與癌症的防禦。每100個使用etanercept治療的病人，少於1個會有嚴重感染。嚴重不良反應的報導包括致命與威脅生命感染與敗血。使用etanercept亦有不同的惡性腫瘤的報導，包括乳癌、肺癌、皮膚癌與淋巴瘤。

亦曾有嚴重血液、神經、自體免疫反應的報導。這些包括少見的全部血球減少報導與相當少見的成形不全性貧血報導。使用etanercept發生中樞與末梢去髓鞘事件亦分別為罕見與相當罕見。亦有罕見狼瘡、與狼瘡相關的情況與血管炎的報導。

不良反應列表

下方不良反應列表是根據成人原開發廠藥品之臨床試驗與上市後研究。
在器官系統分類中，不良反應列於發生頻率（發生不良反應的病人數量）之後，並且使用下列名稱分類：極常見（ $\geq 1/10$ ）；常見（ $\geq 1/100$ 至 $< 1/10$ ）；少見（ $\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$ ）；罕見（ $\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$ ）；極罕見（ $< 1/10,000$ ）；未知（由臨床試驗結果無法預估）。

系統器官分類	極常見 $\geq 1/10$	常見 $\geq 1/100$ 至 $< 1/10$	少見 $\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$	罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$	極罕見 $< 1/10,000$	頻率未知 (無法以現 有資料估 計)
感染與侵染	感染（包括上呼吸 道感染、支氣管 炎、膀胱 炎、皮膚 感染）*		嚴重感染（包括 肺炎、蜂窩性組 織炎、細菌性關 節炎、敗血症與 寄生蟲感染）*	結核病、伺機性 感染（包括侵入微 菌、原蟲、細菌 、非典型分枝 桿菌、病毒感染 與退伍軍人菌）*		B型肝炎再活 化、李斯特 菌
良性、惡性 與未特定的 腫瘤（包括囊 腫與息肉）			非黑色素瘤皮膚癌 *（參見4.4節）	惡性黑色素瘤 （參見4.4節）、淋 巴癌、白血病		牟克耳氏細胞 瘤（參見4.4 節）
血液與淋巴 系統疾病			血小板減少症、 貧血、白血球減 少症、嗜中性白 血球減少症	全血球減少症*	再生不良性貧 血*	噬血細胞組 織增生（巨 噬細胞活化 症候群）*
免疫系統疾病		過敏反應 （見皮膚與皮 下組織疾 病）、自體抗 體形成*	血管炎（包括抗嗜 中性白血球細胞 質抗體血管炎）	嚴重的過敏/過敏 性反應 [anaphylactic reactions]（包括 血管性水腫與支氣 管痙攣）、類肉瘤 病		皮膚炎症狀 惡化
神經系統疾病				疑似患有如多發性 硬化症的中樞神經 去髓鞘症狀或局部 去髓鞘症狀，例如 視神經炎與橫貫性 脊髓炎 （transverse myelitis）（參 見4.4節）、末梢 去髓鞘事件，包括 Guillain-Barré症 候群、慢性發炎去 髓鞘多發性神經 病變、去髓鞘多發 性神經病變與多 病灶運動神經病 變（參見4.4節）、癲癇		
眼睛疾病			葡萄膜炎、鞏膜炎			
心臟疾病			充血性心臟衰竭 惡化（參見4.4節）	新發生的充血性 心臟衰竭（參見 4.4節）		

呼吸、胸腔與縱隔膜疾病				間質性肺部疾病 (包括肺炎及肺纖維化)*		
肝膽系統疾病			肝臟酵素升高*	自體免疫性肝炎*		
皮膚與皮下組織疾病		搔癢、皮疹	血管性水腫、乾癬 (包括新發生或惡化和膿包，主要在手掌及腳掌)、蕁麻疹、乾癬狀皮疹	史蒂芬強森症候群 (Stevens-Johnson Syndrome)、皮膚血管炎 (包括過敏性血管炎)、多形性紅斑、扁平苔癬樣反應	毒性表皮溶解症 (Toxic epidermal necrolysis)	
肌肉骨骼和結締組織疾病				皮膚紅斑性狼瘡症、亞急性皮膚紅斑性狼瘡症、類狼瘡症狀		
一般疾病與注射部位狀態	注射部位反應 (包括出血、瘀傷、紅斑、搔癢、疼痛、腫大)*	發燒				

*選析之不良反應概述如下

選析之不良反應概述

惡性腫瘤及淋巴增生疾病

以etanercept治療6年4,114位類風濕性關節炎病人之原開發廠藥品臨床實驗中，觀察到129個以不同形式新發生的惡性腫瘤病例 (包括在二年活性對照試驗中，231位以etanercept合併methotrexate治療的病人)。這個觀察到的比例與發生率與一般人罹患惡性腫瘤的比例相當。在共有240位乾癬性關節炎參與至多2年的原開發廠藥品臨床試驗中，總共有2個惡性腫瘤病例的報告。在共有2711位重度乾癬病人參與為期至多2.5年的原開發廠藥品臨床試驗，接受etanercept治療的病人在治療期間發生30個惡性腫瘤與43個非黑色瘤皮膚癌病例的報告。

7416位參與etanercept治療的類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎與乾癬病人之原開發廠藥品臨床試驗中，有18個淋巴瘤病例的報告。

在etanercept上市期間，已有若干惡性腫瘤 (包括乳癌、肺癌與淋巴瘤) 之案例報告 (見4.4節)。

注射部位反應

相較於安慰劑組，接受etanercept治療的風濕病病人注射部位反應的發生率較高(36%對9%)。注射部位反應一般都發生在第一個月，平均期間為3至5天。大多數接受etanercept治療組病人的注射部位反應並無需接受治療，需要接受治療的病人則多數接受皮質類固醇或口服抗組織胺治療。另外，某些病人發生回憶性注射部位反應，即前次注射部位與最近一次注射部位同時發生皮膚反應。這些反應一般是暫時性的，治療期間亦不會再發。

在前12個月的控制試驗治療期間，相較於安慰劑組3.4%，接受etanercept治療的乾癬病人注射部位反應的發生率約為13.6%。

嚴重感染

在以安慰劑為對照組的原開發廠藥品實驗顯示，嚴重不良反應(致命的、具生命危險性的、需住院治療或靜脈注射抗生素治療者)的發生率並未增加。在以etanercept治療48個月的類風濕性關節炎病人中，嚴重感染症的發生率為6.3%，這些包括膿腫(發生在不同部位)、菌血症、支氣管炎、滑囊炎、蜂窩性組織炎、膽囊炎、腹瀉、憩室炎、心內膜炎(疑似)、腸胃炎、B型肝炎、帶狀疱疹、腿部潰瘍、口腔感染、骨髓炎、耳炎、腹膜炎、肺炎、腎盂腎炎、敗血症、敗血性關節炎、鼻竇炎、皮膚感染、皮膚潰瘍、泌尿道感染、血管炎及傷口感染。在此2年期活性控制原開發廠藥品試驗中，不論是單獨使用etanercept、單獨使用methotrexate或兩者合併使用，其發生嚴重感染的比例皆相近。然而並不能排除etanercept與methotrexate合併使用與感染率增加的相關性。

在一個至多24週、安慰劑組對照的原開發廠藥品臨床試驗顯示，接受etanercept組與安慰劑組乾癆病人發生感染的比例並沒有差異。發生於etanercept治療病人的嚴重感染包括蜂窩性組織炎、腸胃炎、肺炎、膽囊炎、骨髓炎、胃炎、闌尾炎、鏈球菌所導致的筋膜炎、肌炎、敗血性休克、憩室炎與膿瘍。在一項治療乾癆性關節炎的雙盲開放性原開發廠藥品試驗中，僅有一位接受etanercept治療的病人發生嚴重的感染症(肺炎)。

使用etanercept期間亦有嚴重與致死感染的報告。所報導的病原體包括細菌、分枝桿菌(包括結核菌)、病毒與真菌。某些已有其他疾病的病人(糖尿病、鬱血性心臟衰竭、進行性或慢性感染病史)，再加上他們本身的類風濕性關節炎，在開始etanercept治療的幾個星期內就發生嚴重不良反應(見4.4節)。Etanercept治療可能會增加已具有敗血症病人的死亡率。

使用etanercept曾有伺機性感染的報告，包括侵入性黴菌、寄生蟲(包括原生蟲)、病毒(包括帶狀疱疹)、細菌(包括 *Listeria* 與 *Legionella*)與非典型分枝桿菌感染。依據一個整合的原開發廠藥品臨床試驗數據組，15402個使用etanercept的病人中，發生伺機性感染的整體機率為0.09%。調整後的發生機率為0.06%事件每100個病人年。在上市後經驗，全球發生伺機性感染的報告案例將近一半是侵入性黴菌感染。最常見的侵入性黴菌感染包括 *Candida*、*Pneumocystis*、*Aspergillus*與 *Histoplasma*。在發生伺機性感染的死亡病例中，有超過一半是侵入性黴菌感染。在大部分死亡病人是罹患 *Pneumocystis* 肺炎，未確定原因之全身性黴菌感染與麴菌病(*Aspergillosis*) (參見4.4節)。

自體抗體

在多時間點測量病人的血清樣本中的自體抗體。評估類風濕性關節炎病人的抗核抗體(antinuclear antibody; ANA)，新發生ANA抗體陽性($\geq 1:40$)之病人百分比，etanercept治療組的病人(11%)較安慰劑組(5%)為高。新發生抗雙股螺旋DNA抗體陽性的病人百分比也較高(利用放射免疫分析法測得etanercept治療組為15%，安慰劑組為4%；以 *Crithidia luciliae* 分析法測得etanercept治療組為3%，而安慰劑組為零)。與安慰劑組比較，etanercept治療組產生抗cardiolipin抗體的增加比例相似。Etanercept長期治療對免疫疾病的影響目前尚未知。有病人(包括類風濕因子陽性的病人)罹患其他與類狼瘡症狀相關的自體抗體或紅疹(經由臨床表現與活體組織顯示有亞急性狼瘡或盤型狼瘡存在)的少數報告。

全血球減少症與再生不良性貧血

有罹患全血球減少症與再生不良性貧血，甚至因而死亡的上市後案例報告(見4.4節)。

間質性肺部疾病

在etanercept於各項適應症的原開發廠藥品對照臨床試驗中，接受etanercept且未併用methotrexate病人的間質性肺部疾病發生率(發生比例)為0.06%(發生頻率為罕見)。在允許

併用etanercept和methotrexate治療的原開發廠藥品對照臨床試驗中，間質性肺部疾病的發生頻率（發生比例）為0.47%（發生頻率為少見）。有罹患間質性肺部疾病（包括肺炎和肺纖維化），甚至因而死亡的上市後案例報告。

與 anakinra 合併治療

相較於單獨使用etanercept，兩者併用的研究顯示會增加嚴重感染的風險，2%的病人（3/139）罹患嗜中性白血球減少症（絕對嗜中性白血球數（absolute neutrophil count） $< 1000 /\text{mm}^3$ ）。有一病人在嗜中性白血球減少情況下罹患蜂窩性組織炎，並於住院治療後痊癒。

肝臟酵素升高

在所有針對etanercept適應症進行的原開發廠藥品對照臨床試驗雙盲階段，在接受etanercept而未併用methotrexate的病人中，肝臟酵素升高不良事件發生率（發生比例）為0.54%（發生頻率為少見）。而在etanercept併用methotrexate的原開發廠藥品對照臨床試驗雙盲階段，肝臟酵素升高的不良事件發生率為4.18%（發生頻率為常見）。

自體免疫性肝炎

在etanercept於各項適應症的原開發廠藥品對照臨床試驗中，接受etanercept且未併用methotrexate病人的自體免疫性肝炎發生率（發生比例）為0.02%（發生頻率為罕見）。在允許併用etanercept和methotrexate治療的原開發廠藥品對照臨床試驗中，自體免疫性肝炎的發生頻率（發生比例）為0.24%（發生頻率為少見）。

孩童

在幼年型慢性關節炎病童的不良反應

一般而言，不良反應在幼年型慢性關節炎兒童的發生率及形式與成人相似。下列的段落將討論兒童與成人或其他特殊狀況下的差異。

在一個以2至18歲幼年型慢性關節炎病人的原開發廠藥品臨床實驗報告中，所發生的感染型式通常是輕微至中度的，並與一般門診的小兒科病人常見的一致。所發生的嚴重不良反應包括水痘（具有治療後無後遺症的無菌性腦膜炎徵候症狀）（見4.4節）、闌尾炎、腸胃炎、抑鬱症/人格異常、皮膚潰瘍、食道炎/胃炎、A型鏈球菌敗血性休克、第I型糖尿病、軟組織及手術後傷口感染。

在69位年齡在4至17歲幼年型慢性關節炎病人的原開發廠藥品臨床實驗報告中，在試驗的三個月（第一部分，開放性試驗），接受etanercept治療的69位幼年型慢性關節炎病人有43位（62%）曾發生感染現象，發生率與嚴重度與完成12個月開放性延長試驗的58位病人相似。在幼年型慢性關節炎病人的其他不良反應之形式與發生率，與接受etanercept治療的成年類風濕性關節炎病人的原開發廠藥品臨床試驗所觀察之結果相似，且大部分是輕微的。接受三個月etanercept治療的69位幼年型慢性關節炎病人有些不良反應較349位成年類風濕性關節炎病人更為常見，這些反應包括頭痛（19%的病人，每年每個病人1.7件），噁心（9%，每年每個病人1.0件），腹部疼痛（19%，每年每個病人0.74件）及嘔吐（13%，每年每個病人0.74件）。

幼年型慢性關節炎的原開發廠藥品臨床試驗中有4個巨噬細胞活化症候群的報告。

在上市後資料中，使用etanercept治療的幼年型慢性關節炎中有發炎性腸疾病與葡萄膜炎的報告，包括有極少數的病例有正向的再激發（rechallenge）反應（參見4.4節）。

在乾癬病童的不良反應

在一個48週，以211個4至17歲幼年乾癬病人的原開發廠藥品臨床實驗報告中，不良反應的發生與成年乾癬病人相似。

疑似不良反應之通報

藥品核准上市後，通報疑似不良反應非常重要，可持續監測藥品的效益/風險平衡。

4.9 過量

在類風濕性關節炎病人的原開發廠藥品臨床試驗中，並未觀察到本藥與劑量限制有關的毒性作用。目前所評估的最高劑量為接受32 mg/m²靜脈注射起始劑量後，接著每星期二次皮下注射16 mg/m²的劑量。有一個類風濕性關節炎的病人錯誤的自我皮下注射etanercept 62毫克的劑量，每週二次，持續三個星期，不過並未產生不良反應。目前etanercept尚無解毒劑。

5. 藥理學特性

5.1 藥效學特性(以下段落來自etanercept原開發廠藥品之臨床試驗數據)

藥理治療學分類：免疫抑制、腫瘤壞死因子(TNF- α)抑制劑。

ATC Code: L04AB01

腫瘤壞死因子(TNF)是類風濕性關節炎發炎步驟中的一種主要的細胞激素(cytokine)。在乾癬性關節炎病人及僵直性脊椎炎病人的血清與滑液組織也可發現較高濃度的TNF。與其他未受侵犯部位比較，由發炎細胞(包括T細胞)引起的發炎反應會增加乾癬部位的TNF濃度。Etanercept為TNF結合到細胞表面接受體的競爭性抑制劑，因而抑制TNF的生物活性。TNF及淋巴毒素(lymphotoxin)是造成發炎的cytokine前驅物質，分別結合在二種不同的細胞表面接受體：55-kilodalton(p55)及75-kilodalton(p75)的腫瘤壞死因子接受體(TNFRs)。二種TNFRs皆以與細胞膜結合及可溶解的型式自然存在，可溶的TNFRs被認為可調節TNF的生物活性。

TNF及淋巴毒素主要以homotrimer型式存在，其生物活性依賴與細胞表面TNFRs的交叉結合。可溶解的二元體(dimeric)接受體(如etanercept)較單元體(monomeric)接受體與TNF具較高的親和力，被認為是TNF結合至細胞膜接受體的強效競爭性抑制劑。另外，在二元體接受體的構造中使用免疫球蛋白Fc部分作為溶合部位，會使得本藥具較長的血清半衰期。

作用機轉

類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎的許多關節病徵及乾癬的皮膚病症是由發炎前驅物質當媒介且受控於與TNF連結的網狀系統。Etanercept的作用機轉被認為是會競爭性抑制TNF結合到細胞表面TNFR，造成TNF生物性的不活化，以防止TNF調節的反應。Etanercept亦可能會調節被TNF誘發(或調節)的更下游分子(如：cytokines、附著分子或蛋白酵素)所控制的生物反應。

臨床療效與安全性(以下段落來自etanercept原開發廠藥品之臨床試驗數據)

此節收錄的資料是來自四個類風濕性關節炎成年病人的隨機對照試驗、一個乾癬性關節炎成年病人試驗、一個僵直性脊椎炎成年病人試驗、四個成人乾癬試驗、三個多關節幼年型慢性關節炎試驗與一個幼年病人乾癬試驗。

成人類風濕性關節炎

曾以隨機分配、雙盲，以安慰劑為對照組的臨床試驗進行etanercept的有效性評估。此試驗納入234位具有活動性類風濕性關節炎的成年病人，這些病人至少曾接受一種(不超過四種)，但治療

無效之疾病緩解型抗風濕性藥物(DMARDs)。每週二次皮下注射10毫克或25毫克etanercept或安慰劑，連續六個月，這個控制的試驗，採用美國風濕醫學會(ACR)反應標準來評估類風濕性關節炎改善的百分比。與對照組相比，在第三及第六個月觀察的結果，以etanercept治療病人的ACR 20及50反應較大(ACR 20在第三個月與第六個月分別為：etanercept組62%與59%，對照組23%與11%；ACR 50在第三個月與第六個月分別為：etanercept組41%與40%，對照組8%與5%；etanercept相對安慰劑組於所有ACR 20與ACR 50反應： $p \leq 0.01$)。

約有15%的受試者在以etanercept治療的第三及第六個月時達到ACR 70反應，相較之安慰劑組只有低於5%的比例。在以etanercept治療的病人之臨床反應一般出現在開始治療後1至2個星期，而且幾乎都發生在三個月內，並可從劑量反應曲線得知。投與10毫克劑量的結果介於安慰劑及25毫克劑量之間。對於所有ACR標準及其他非ACR反應標準之類風濕性關節炎疾病的測量結果(如晨僵感)，在所有的項目中，etanercept治療組皆明顯優於安慰劑組。在試驗期間，每三個月進行健康評估問卷調查(HAQ)，調查項目包括失能程度、生命力、精神健康狀態、一般健康狀態及與關節炎有關的健康狀態次項目。在第三個月及第六個月時，相較於對照組的病人，接受etanercept治療病人的所有健康評估問卷調查內次項目皆有所改善。


在中止etanercept治療後，關節炎的症狀通常會在一個月內復發。依據開放性試驗結果，在中止etanercept治療後再度接受etanercept治療達24個月，會達到與未中斷etanercept治療病人相似程度的治療反應。開放性延長治療試驗結果顯示，未中斷etanercept治療的病人可觀察到持續、觀察到最高耐久的治療反應達10年，不過目前沒有更長時間使用的經驗。

一隨機分配，盲性，以X光照片之活性控制研究評估作為研究目標，在632位從未接受過methotrexate治療的活動性類風濕性關節炎病人(病期<三年)，比較etanercept與口服methotrexate的治療效益。每週二次皮下注射10毫克或25毫克的etanercept，持續24個月。在試驗的前面八週，methotrexate的劑量由每週7.5毫克增加到每週20毫克，並持續至24個月。25毫克etanercept的臨床改善效果與前二個試驗所觀察到的結果相同，亦維持到24個月。在投藥前，病人具有中等程度的失能，平均HAQ分數在1.4至1.5之間。以25毫克etanercept治療12個月後可獲得實質上的改善，約44%病人的HAQ分數可達成正常值(少於0.5)。這些效益仍可維持到試驗的第二年。

在這個試驗中，關節結構性的傷害以影像學(Radiographic)評估，並以合計的SHARP分數及其項目(Total Sharp Score;TSS)、侵蝕性分數及關節空間狹隘分數(JSN)的改變呈現結果。在實驗開始及第6、12、24個月時進行手部/腕部及足部影像學。投與10毫克etanercept劑量對結構性傷害的作用，皆小於投與25毫克劑量。在12個月與24個月的試驗期間，25毫克的etanercept在侵蝕性分數方面明顯較methotrexate為佳。25毫克etanercept與methotrexate在TSS及JSN方面無統計上的差異。試驗結果請見下圖。

影像學惡化情況(Radiographic progression)：

原開發廠藥品臨床試驗中，類風濕性關節炎病人(病期<三年)之etanercept與口服methotrexate的治療效益比較



另一個活性對照、雙盲、隨機分配試驗中，以682位罹患6個月到20年（中位數為5年）活動性類風濕性關節炎且至少對一個疾病緩解型抗風濕性藥物(DMARDs)（不包括methotrexate）沒有療效反應的病人為對象，比較單獨以etanercept治療（每週一次25毫克）、單獨以methotrexate治療（每週7.5到20毫克，劑量中位數為20毫克）以及同時以etanercept與methotrexate合併治療評估臨床有效性、安全性與影像學惡化情況。

與兩組單獨治療組比較，etanercept與methotrexate合併治療組的病人之ACR 20、ACR 50與ACR 70反應顯著升高且在24週與52週的DAS與HAQ指數明顯改善（結果見下表）。在24個月後也觀察到相同的情形，etanercept與methotrexate合併治療組明顯地優於etanercept或methotrexate兩組單獨治療組。

原開發廠藥品之臨床藥效結果：罹患6個月到20年類風濕性關節炎病人以etanercept與methotrexate 及etanercept與methotrexate 合併治療之比較

評估指標	Methotrexate (n = 228)	Etanercept (n = 223)	Etanercept + Methotrexate (n = 231)
ACR 反應^a			
ACR 20	58.8%	65.5%	74.5% ^{†, φ}
ACR 50	36.4%	43.0%	63.2% ^{†, φ}
ACR 70	16.7%	22.0%	39.8% ^{†, φ}
DAS			
基準線指數 ^b	5.5	5.7	5.5
第52週的指數 ^b	3.0	3.0	2.3 ^{†, φ}
緩解 ^c	14%	18%	37% ^{†, φ}
HAQ			
基準線	1.7	1.7	1.8
第52週	1.1	1.0	0.8 ^{†, φ}


a：未完成12個月試驗的人，視為沒有反應。

b：疾病活動度積分(Disease Activity Score (DAS))的數值為平均後的結果。

c：緩解定義為DAS <1.6成對比較p-values: † = $p < 0.05$ 為Etanercept + Methotrexate vs Methotrexate 的比較，而 $\phi = p < 0.05$ 為Etanercept + Methotrexate vs Etanercept的比較

Etanercept組在第12個月的影像學惡化情況明顯優於methotrexate組，而併用組則以緩慢的影像學惡化情況明顯優於兩個單獨使用組（見下表）。

影像學惡化情況：原開發廠藥品臨床試驗中，罹患6個月到20年類風濕性關節炎病人以Etanercept與Methotrexate及Etanercept與Methotrexate 合併治療之比較（12 個月的結果）



成對比較p-values: * = $p < 0.05$ 為Etanercept vs Methotrexate的比較；† = $p < 0.05$ 為Etanercept + Methotrexate vs Methotrexate的比較，而 $\phi = p < 0.05$ 為Etanercept + Methotrexate vs Etanercept的比較

在24個月後也觀察到相同的情形，etanercept與methotrexate合併治療組明顯地優於etanercept或methotrexate兩組單獨治療組。同樣地，在24個月後也觀察到etanercept單獨治療組明顯地優於methotrexate單獨治療組。

若將不論任何原因而退出試驗的病人視為惡化，以此來做分析，在24個月時，沒有惡化（TSS變化 ≤ 0.5 ）的病人百分比，etanercept併用methotrexate組高於etanercept組與methotrexate組兩單獨治療組（各組分別為62%、50%與36%； $p < 0.05$ ）。兩單獨治療組間的差異也很明顯（ $p < 0.05$ ）。部分完成全部24個月治療試驗的病人，其未惡化比率分別為78%，70%及61%。

一有420位活動性類風濕性關節炎病人參與的雙盲、安慰劑對照組試驗，做為評估每星期一次50毫克etanercept（兩次25毫克皮下注射）的安全性與有效性。在此試驗中，53位病人給予安慰劑、214位病人每週一次給予50毫克、153位病人每週兩次給予25毫克etanercept。比較第八週的類風濕性關節炎的徵兆與症狀資料，兩組etanercept治療組的安全性與有效性相似；然而第16週則沒有顯示兩治療組有相似性。單一注射每毫升50毫克的etanercept與同時注射兩劑每毫升25毫克具有相同的生體相等性。

成人乾癬性關節炎

以一隨機、雙盲、以安慰劑為對照組的研究，進行etanercept的有效性評估。此試驗納入205位具有活動性乾癬性關節炎的病人（關節腫脹三個以上且關節疼痛三個以上），這些病人年齡介於18歲到70歲之間，並且下列的形式中至少具有一種：（1）侵犯遠端指骨間關節（2）多處關節侵犯（無類風濕性結節且出現乾癬）（3）關節炎性磨損（arthritis mutilans）（4）不對稱型乾癬性關節炎；或（5）類似脊椎炎之僵直；且病人之斑狀乾癬直徑需 ≥ 2 公分。病人曾接受下列藥物治療的比例為：NSAIDs(86%)、DMARDs(80%)與皮質類固醇(24%)。目前正使用MTX治療的病人（持續兩個月以上），可以每週 ≤ 25 毫克的劑量繼續治療。每週兩次皮下注射25毫克的etanercept(根據類風濕性關節炎之劑量研究)或安慰劑，連續六個月。在此雙盲研究結束後，病人可再進入另一2年期之長期開放性延伸研究。

其結果以病人達到ACR 20、50、70反應的百分比以及依據乾癬性關節炎藥物反應改善標準（PsARC）的百分比表示，結果列於下表中：

在以安慰劑為對照組的原開發廠藥品試驗中，乾癬性關節炎病人的反應

乾癬性關節炎病人的反應		病人百分比	
		安慰劑組 (n = 104)	etanercept ^a (n = 101)
ACR 20	第三個月	15	59 ^b
	第六個月	13	50 ^b
ACR 50	第三個月	4	38 ^b
	第六個月	4	37 ^b
ACR 70	第三個月	0	11 ^b
	第六個月	1	9 ^c
PsARC	第三個月	31	72 ^b
	第六個月	23	70 ^b

a: 每週兩次，皮下注射etanercept 25毫克

b: $p < 0.001$, Etanercept vs. 安慰劑組

c: $p < 0.01$, Etanercept vs. 安慰劑組

在使用etanercept的乾癬性關節炎病人中，前四週的臨床反應明顯，且治療的六個月期間效果持續。在疾病活性的所有測量中，etanercept治療組明顯優於安慰劑組($P < 0.001$)，且併用methotrexate與無併用methotrexate的藥物反應相近。使用HAQ量表的殘疾程度來評估乾癬性關節炎病人在每個時間點的生活品質，發現使用etanercept治療的乾癬性關節炎病人，與對照組比較($P < 0.001$)，在每個時間點皆有明顯的改善。

乾癬性關節炎病人已進行了影像學惡化情況變化的評估。手部與腕部的影像學取於基線6、12、24個月。第12個月的合計的SHARP分數(Total Sharp Score; TSS)修改後列於下表。若將不論任何原因而退出試驗的病人視為惡化，以此來做分析，在12個月時，沒有惡化(TSS變化 ≤ 0.5)的病人百分比，etanercept治療組高於安慰劑組(分別為73%與47%; $p \leq 0.001$)。在第二年繼續使用etanercept治療的病人並不會造成影像學持續的惡化。周圍關節受損之緩解在多關節對稱型的病人中觀察到。

原開發廠藥品臨床試驗中，合計的SHARP分數平均（從基線）之年度改變

時間	安慰劑組 (n = 104)	Etanercept組 (n = 101)
12 個月	1.00 (0.29)	-0.03 (0.09) ^a

SE = 標準誤差(standard error)

a. p = 0.0001.

在雙盲期間身體活動功能因etanercept治療而得到改善，此利益可維持在兩年長期接觸此治療。

由於參與研究的病人數太少，所以沒有足夠的數據顯示etanercept有治療類僵直性脊椎炎之乾癆性關節病變的療效。

並沒有試驗做過以每週一次50毫克的療程治療乾癆性關節炎病人。這群病人的每週一次劑量療程的療效證據，是基於僵直性脊椎炎病人的試驗資料而來的。

成人僵直性脊椎炎

有三個隨機、雙盲、有安慰劑對照組、共401位病人參與的試驗，比較了每週2次25毫克恩博與安慰劑的有效性(其中203位以恩博治療)。其中最大的試驗(n = 277)納入具有活動性僵直性脊椎炎的病人，這些病人年齡介於18歲到70歲之間，其定義為平均發病期間視覺類比量表(visual analog scale, VAS)≥30與晨僵感強度並加上下列三種參數中至少兩者的VAS≥30：病人總體性的評估；夜間背痛與整體背痛的平均VAS值；Bath僵直性脊椎炎功能指數中10個問題的平均(BASFI)。病人可繼續服用穩定劑量的DMARDs、NSAIDs、或類固醇。本試驗不包括脊椎完全僵硬的病人。

在138位病人中，劑量為連續六個月每週二次皮下注射25毫克恩博(根據類風濕性關節炎病人之劑量試驗)或安慰劑。有效性的主要評估為僵直性脊椎炎活性量表(ASAS)的4項評估(病人總體性的評估、背痛、BASFI、與發炎)中至少3項改善20%(ASAS 20)，且其餘項目沒有惡化傾向。ACR 50及70的定義採用相同的標準，只是改善程度分別為50%或70%。相較於對照組，以恩博治療在ASAS 20評估上在開始治療兩星期後就有明顯的改善。

在原開發廠藥品之安慰劑對照試驗中，僵直性脊椎炎病人的反應		
	病人百分比	
僵直性脊椎炎反應	安慰劑組 N=139	Etanercept組 N=138
ASAS 20		
兩星期	22	46 ^a
三個月	27	60 ^a
六個月	23	58 ^a
ASAS 50		
兩星期	7	24 ^a
三個月	13	45 ^a
六個月	10	42 ^a
ASAS 70		
兩星期	2	12 ^b
三個月	7	29 ^b
六個月	5	28 ^b

a: P<0.001, etanercept vs. 安慰劑
b: P=0.002, etanercept vs. 安慰劑

使用etanercept的僵直性脊椎炎病人中，臨床反應出現於第一次返診（2星期）時且持續於六個月的治療期，一開始併用或未併用其他療法的病人，其反應皆相似。

在另兩個較小型的僵直性脊椎炎試驗中也獲得類似的結果。

在第4個雙盲、有安慰劑對照組、共356位活動性僵直性脊椎炎病人的試驗中，比較評估了etanercept每週一次50毫克（2劑皮下25毫克注射）與etanercept每週2次25毫克的安全性與療效。結果顯示，兩組的安全性與療效相似。

成人乾癬

Etanercept建議使用的病人範圍已於4.1節定義。研究對象中治療無效的病人定義為反應不足（PASI<50或PGA評估低於「好」），或治療中病情惡化，且病人至少接受三種主要全身性治療中的一種並在充足的時間內獲得足夠劑量以評估其反應。

患有中度至重度乾癬的病人，etanercept相對其他全身性療法的有效性尚未有直接試驗評估。相對地，etanercept的安全性與有效性已經由四個隨機、雙盲、安慰劑對照試驗評估。四個試驗的主要療效指標為12週期間，每個治療族群達到PASI 75的比例（換言之，至少乾癬範圍及嚴重度指標（PASI）與基準點相比改善了75%）。

研究一為18歲以上且體表10%以上具活動性但臨床上穩定的乾癬病人為對象之第2階段試驗。112位病人隨機分配使用每週兩次25毫克etanercept(n=57)或安慰劑(n=55)達24週。

研究二為評估652位慢性乾癬的病人並以與研究一相同的收納標準(PASI≥10)篩選。連續6個月給予每週一次25毫克、每週兩次25毫克或每週兩次50毫克。在前12個月的雙盲試驗期間，給予病人安慰劑或三種etanercept治療劑量中的一種。治療12週後，安慰劑組的病人在未告知下開始給予etanercept（每週兩次25毫克）；活性治療組的病人則繼續服用原本的藥物直到24週。

研究三為評估583位病人並以與研究二相同的標準篩選。此試驗中，前12週病人給予每週兩次25毫克或50毫克的etanercept，或安慰劑。之後24週所有病人給予每週兩次25毫克的etanercept（開放標籤）。

研究四為評估142位病人並以與研究二及研究三相似的標準篩選。此試驗中，前12週病人給予每週一次50毫克的etanercept或安慰劑。之後12週所有病人給予每週一次50毫克的etanercept（開放標籤）。

研究一中，etanercept治療組在12週時具有PASI 75反應的病人比例（30%）明顯大於安慰劑治療組（2%）（P<0.0001）。第24週時，etanercept治療組達到PASI 75的病人比例為56%，安慰劑治療組則為5%。研究二、三與四的主要結果列於下方。

在原開發廠藥品之研究二、三與四中，乾癬病人的反應

	研究二						研究三			研究四		
	Etanercept						Etanercept			Etanercept		
	安慰劑	25 mg BIW		50 mg BIW			安慰劑	25 mg BIW	50 mg BIW	安慰劑	50 mg QW	50 mg QW
反應	n =166 12 週	n =162 12 週	n =162 24 週 ^a	n =164 12 週	n =164 24 週 ^a		n =193 12 週	n =196 12 週	n =196 12 週	n =46 12 週	n =96 12 週	n =90 24 週 ^a

(%)											
PASI 50	14	58*	70	74*	77	9	64*	77*	9	69*	83
PASI 75	4	34*	44	49*	59	3	34*	49*	2	38*	71
DSGA ^b , clear or almost clear	5	34*	39	49*	55	4	39*	57*	4	39*	64
* $p \leq 0.0001$ (相對於安慰劑組) a. 在研究二與研究四中，因為最初的安慰劑組從13到24週開始每週兩次給予25毫克或每週一次給予50毫克etanercept，所以24週時沒有與安慰劑組做統計上的比較 b. Dermatologist Static Global Assessment。以0或1表示0到第5等級之清除(clear)或幾乎清除											

給予etanercept之乾癬病人之療效反應，相對於安慰劑組，在前兩週最為明顯且持續於治療的24週內。

在病人於24週時，因達到PASI改善至少50%而停止治療期間，研究二也有藥物戒斷(withdrawal)期間。有病人因停藥後發生回躍反應(rebound)(PASI $\geq$ 基準點的150%)與復發情形(定義為至少失去一半從開始到24週所達成之改善)而停止治療。於藥物戒斷期間，在平均時間到三個月的疾病復發時間內，乾癬症狀逐漸回復。無觀察到有疾病回躍反應與嚴重乾癬相關性不良反應。有某些跡象支持初期對治療有反應的病人再次使用etanercept有其益處。

研究三中，大多數病人(77%)初期隨機分配於使用每週兩次50毫克的劑量，且於12週時減少etanercept劑量到每週兩次25毫克並維持PASI 75直到36週。對於療程中皆給予每週兩次25毫克的病人，其PASI 75之反應於12週至36週之間持續改善。

研究四中，etanercept治療組的病人(38%)在12週時達到PASI 75的比例較安慰劑組的病人(2%)高($p < 0.0001$)。整個研究期間都接受每週一次50毫克etanercept治療的病人，反應持續改善，有71%病人在24週達到PASI 75。

在持續給予etanercept的長期(至多34週)開放性試驗，etanercept的療效是持續的，且安全性和短期使用相當。

臨床試驗數據的分析並沒有顯示任何基礎疾病特徵，可幫助臨床醫師選擇最適當的劑量(間歇或持續)，因此，需依據醫師的判斷與個別病人的需求來選擇間歇或持續治療。

Etanercept的抗體

在部份接受etanercept治療病人的血清中能測得etanercept的抗體，這些抗體都是非中和性且通常為暫時性的。研究結果顯示，產生抗體與臨床療效或不良反應沒有關聯性。

在接受核准劑量範圍內的etanercept治療12個月後，累積約有6%的類風濕性關節炎受試者、7.5%的乾癬性關節炎受試者、2%的僵直性脊椎炎受試者、7%的乾癬受試者、9.7%幼年乾癬受試者和4.8%的幼年型慢性關節炎受試者會產生抗etanercept抗體。

在長期研究(至多3.5年)中發現，受試者產生etanercept抗體的比例會隨著使用期間而增加。然而，由於其暫時性的特質，於類風濕性關節炎受試者和乾癬性關節炎受試者在每個檢測點有測得

抗體的發生率小於7%。

在乾癬的長期研究中，病人接受每週兩次50毫克治療達96週，約9%的檢測點有測得抗體。

上述資料所顯示的是原開發廠以酵素連結免疫吸附分析法(ELISA)檢測結果認定為anti-etanercept抗體陽性的病人人數。免疫原性分析法的結果可能受多種因子的影響，包括分析法的敏感度與特異性、檢體處理方式、檢體收集時間、併用的藥品與潛在疾病。基於這些原因，若以anti-etanercept抗體之發生率比較其他試驗或對於其他藥品抗體之發生率，可能會產生誤導結果。

孩童

兒童多關節性幼年型慢性關節炎

以納入69位患有不同起始形態的多關節性幼年型慢性關節炎病童為受試者的二部分試驗，評估etanercept的安全性及有效性。年齡在4至17歲之間，具中度至重度活動性多關節性幼年型慢性關節炎，對methotrexate不具反應性或不耐受的病童被納入試驗。病人仍持續接受穩定劑量的單一種非類固醇抗發炎藥與/或prednisone治療(<0.2 mg/kg/day或最大劑量10毫克)。第一部分所有的病人皆每週接受二次0.4 mg/kg(每次最大劑量為25毫克)etanercept皮下注射。第二部分則是將接受etanercept治療後第90天具有臨床反應的病人，隨機分配為繼續接受etanercept治療組或接受安慰劑組，持續四個月，以評估疾病狀態。使用JRA改善定義(Definition of Improvement; DOI)，以六項JRA核心標準中至少三項有≥30%改善及在六項中少於一項有≥30%惡化，包括發病關節數，運動的限制、醫師及病人(或父母)總體性的評估、功能性評估及紅血球沉降速率(ESR)。病情擴大之定義為JRA核心標準中有三項產生≥30%的惡化及六項JRA核心標準中沒有一項以上產生≥30%的改善，以及至少具有二個發病的關節。

在第一部分的試驗，69位病人中有51位(74%)產生臨床上的反應，並進入第二部分試驗。接受etanercept治療的25位病人中有六位(24%)病情擴大，而接受安慰劑的26位病人中有20位(77%)病情擴大($p=0.007$)。從第二部分試驗開始算起，產生病情惡化的中間數值在接受etanercept治療組病人為116天，而安慰劑組為28天。對於接受etanercept治療第90天時具有臨床反應的病人，在進入第二部分試驗時有些仍持續接受etanercept治療，其病情改善現象可由第三個月延續至第七個月，但是接受安慰劑組病人則未產生改善現象。

在一個開放性安全性延續試驗，有58位兒童病人(開始使用之最小年齡為四歲)繼續接受etanercept治療，其中有18位接受達十年以上，從以上有限的資料沒有觀察到嚴重不良事件與嚴重感染隨物暴露時間而增加的情形。

Etanercept單一治療($n=103$)，etanercept併用methotrexate($n=294$)和methotrexate單一治療($n=197$)的長期安全性評估約3年，收錄594位2到18歲幼年型慢性關節炎兒童，其中2到3歲有39位。整體而言，使用etanercept比單獨使用methotrexate感染機率較高(3.8% versus 2%)，而且與使用etanercept有關的感染，其嚴重程度更高。

對於多關節性幼年型慢性關節炎病人在開始etanercept治療三個月後沒有藥物反應者，目前並尚無評估持續使用etanercept治療的試驗。此外，研究並無針對幼年型慢性關節炎病人在長期使用etanercept下評估停止或降低其建議劑量的效果。

另一項開放標記的單一組別試驗中，60位擴大型少關節型關節炎(extended oligoarthritis)病人(2至4歲共15人，5至11歲共23人，12至17歲共22人)、38位筋膜炎相關關節炎(enthesis-

related arthritis) 病人(12至17歲)，以及29位乾癬性關節炎病人(12至17歲)，每週一次以 etanercept 0.8毫克/公斤治療(每次劑量上限50毫克)，共12週。各種幼年型慢性關節炎亞型的病人，大部分都達到ACR Pedi 30的條件，此外，在關節疼痛數與醫師整體評估等次要評估指標上顯示具有臨床改善。安全性資料與其他幼年型慢性關節炎試驗結果一致。

幼年乾癬

Etanercept的有效性已經由一個隨機、雙盲、安慰劑對照試驗在211個4到17歲中度至重度乾癬(sPGA score ≥ 3 、面積超過身體面積(BSA)的10%及PASI ≥ 12)的患童評估。符合條件的病人必須曾經接受過光照療法或全身性治療，或以局部治療無法有效控制。

病人接受0.8毫克/公斤的劑量(最大劑量為50毫克)或安慰劑，每週一次，共12週。在12週時，etanercept治療組的病人有療效反應(例如：PASI75)的比例較安慰劑組的病人高。

原開發廠藥品臨床試驗中，第12週幼年乾癬病人的反應

	Etanercept 0.8 mg/kg QW (N = 106)	安慰劑 (N = 105)
PASI 75, n (%)	60 (57%) ^a	12 (11%)
PASI 50, n (%)	79 (75%) ^a	24 (23%)
sPGA “clear” 或 “minimal”, n (%)	56 (53%) ^a	14 (13%)

sPGA – static Physician Global Assessment.

^a. $p < 0.0001$ (相對於安慰劑組)

在接受12週雙盲治療後，所有的病人都繼續接受24週的etanercept 0.8毫克/公斤(最大劑量為50毫克)。在開放性期間的觀察結果與雙盲期間相似。

在隨機分配撤回期間，相較於再次隨機分配到etanercept治療組的病人，再次隨機分配到安慰劑組的病人遭遇疾病復發(低於PASI 75療效反應)明顯的較多。在持續治療期間，療效反應持續維持至48週。

181位幼年乾癬兒童參與一個超過48週至多2年每週每公斤使用etanercept 0.8毫克一次(最高50毫克)之開放性評估長期安全性和療效的研究。與原先的48週研究一般性的比較，長期使用etanercept並無任何新安全性顧忌的發現。

5.2 藥動學特性 (本章節內容來自etanercept原開發廠之臨床試驗數據)

Etanercept的血清中濃度以ELISA方法測定，此法可檢測出與ELISA反應之代謝物及原型成分。

吸收

Etanercept皮下注射後，於注射部位緩慢吸收，在投與單次劑量後約48小時可達最高血中濃度。絕對生體可用率為76%。每週投藥二次，所達到的穩定狀況濃度約為單次投與後的二倍。在健康志願者單次皮下注射25毫克etanercept的平均最高血清濃度為 $1.65 \pm 0.66 \mu\text{g/mL}$ ，平均濃度曲線下面積為 $235 \pm 96.6 \mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ 。

穩定狀態下，治療類風濕性關節炎病人的平均血漿濃度，在每週一次50毫克etanercept (n=21) vs每週兩次25毫克etanercept (n=16)分別為 $C_{\max}$: 2.4 mg/L vs 2.6 mg/L、 $C_{\min}$: 1.2 mg/L vs 1.4

mg/L、與局部AUC：297 mg·hr/L vs 316 mg·hr/L。在一開放標記、單一劑量、雙治療組、交叉試驗中，發現健康受試者單一使用50 mg/mL的etanercept注射劑與同時使用兩次25 mg/mL具生體相等性。

在僵直性脊椎炎病人族群的藥物動力學分析中，etanercept於穩定狀態下的AUC_{s.s}，在etanercept每週一次50毫克組(N=154)與每週兩次25毫克組(N=148)，分別是466 μg·hr/mL與474 μg·hr/mL。

分佈

Etanercept的濃度與時間分佈曲線為雙指數曲線。Etanercept的分佈體積中間值為7.61公升。穩定狀態的分佈體積為10.41公升。

排除

Etanercept在身體的清除率緩慢，半衰期長，約為70小時。類風濕性關節炎病人的廓清率約為每小時0.066公升，較健康志願者的每小時0.11公升略低。此外，etanercept對於類風濕性關節炎病人、僵直性脊椎炎病人與乾癬病人的藥動機轉類似。

在男性與女性的藥動學性質並無不同。

線性

尚未正式進行評估劑量比例性，但是觀察在投藥劑量範圍內的廓清率，並未發現明顯的飽和現象。

特殊族群

腎功能不全

雖然在投與放射線標定之etanercept於病人及健康志願者後，可於尿液中測得排除之放射性活性，但是並未觀察到急性腎衰竭病人有較高的etanercept尿中濃度，因此對於腎功能不全的病人，無需調整etanercept的劑量。

肝功能不全

在急性肝衰竭病人並無觀察到濃度增加，肝衰竭病人尚無須調整劑量。

老年人

Etanercept的血清濃度對老年病人的影響曾以族群的藥動學分析進行研究。年齡在65至87歲病人的廓清率及量，與年齡低於65歲的病人相近。

孩童

多關節性幼年型慢性關節炎病人

在以etanercept治療多關節性幼年型慢性關節炎的臨床實驗中，每週二次投與69位病人(年齡在4至17歲)0.4毫克/公斤劑量的etanercept，為期三個月。血清濃度曲線特性與成年類風濕性關節炎病人相似。在最年輕的病人族群(年齡為四歲)的廓清率(隨著體重正常增加而增加)較年齡較長兒童(12歲)及成人為低。模擬劑量的實驗結果顯示，年紀較大兒童(10-17歲)的血清中濃度與成人近似，而年齡較小的兒童的血中濃度則較低。

幼年乾癬病人

幼年乾癬(4到17歲)病人接受0.8毫克/公斤的劑量(最大劑量為50毫克)，每週一次，至多48週。到達穩定狀態的平均波谷濃度在12、24和48週時的範圍為1.6至2.1 mcg/mL。在幼年乾癬病人觀察到的平均濃度與多關節性幼年型慢性關節炎病人(0.4毫克/公斤劑量的etanercept、每週兩次，每

週最大劑量50毫克)相似。這些平均濃度與成年乾癬病人以每週25毫克etanercept、每週兩次相似。

5.3 臨床前安全試驗數據(本章節內容來自etanercept原開發廠藥品之試驗數據)

在etanercept的毒理學實驗中，並無劑量限制與標的器官毒性的證據。經由一組離體及活體實驗結果認為，etanercept不具基因毒性。由於etanercept在啮齒類動物會產生中和性抗體，因此未進行etanercept的致癌性、生殖力及出生後毒性之標準實驗。

在單次皮下注射2000毫克/公斤或靜脈注射1000毫克/公斤的劑量於小鼠及大鼠的實驗中，並未發現etanercept引起之致死性的或明顯的毒性作用。每週二次連續皮下注射4或26週15毫克/公斤劑量之於cynomolgus猴，此一劑量所獲得之AUC血清濃度超過人類建議劑量(25毫克)所獲得之血清濃度的27倍，但並未產生劑量限制或標的器官毒性作用。

6. 藥劑學特性

6.1 賦形劑

Glycine
Trisodium citrate dihydrate
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Sucrose
Sodium chloride
Water for injection

6.2 不相容性

目前尚未進行不相容性之研究，因此本藥不可與其他藥品混合使用。

6.3 儲存之特別注意事項

2°C-8°C 冷藏儲存。不可冷凍。

請將預充填注射針筒避光儲存於產品外盒中。保存etanercept在外盒中以避光。

準備注射前的15-30分鐘，請先將預充填注射針筒自冰箱取出讓注射液達到室溫。

切勿使用其他方式使產品回溫，回溫後建議立即使用。

Nepexto從冰箱取出後，可於不高於25°C條件下儲存四週，此後產品不可再冷藏。若移出冰箱後，未於四週內使用，應立即丟棄。建議您紀錄從冰箱中取出Nepexto的時間與應丟棄的時間點(從冰箱取出後不超過四週)。

6.4 包裝之材料及成份

(1)預充填針筒裝

透明玻璃注射器 (Type I玻璃) 與不銹鋼27號針頭，針頭蓋與FluroTec coated bromobutyl rubber stopper活塞。每一包裝中含有etanercept預充填針筒裝注射劑與等數量的酒精棉。

(2)預充填注射筆

包含一支透明玻璃注射器 (Type I玻璃) 與不銹鋼27號針頭，針頭蓋與FluroTec coated bromobutyl rubber stopper活塞。每一包裝中含有etanercept預充填注射筆與等數量的酒精棉。

6.5 處置特別注意事項使用及操作說明

在注射之前，單次使用的etanercept針筒裝注射劑或預填充注射筆應達到室溫 (大約15到30分鐘)。當etanercept達到室溫前，針頭蓋不應被移除。液體應為澄清、無色至乳白色或淡黃色，

可能含有半透明或白色的蛋白質微粒。

完整用藥指示請參見第7節「準備和注射Etanercept的步驟」

應依當地法規，處置任何未使用的產品或廢棄物。

7 準備和注射Nepexto的步驟

本節內容可分成下列幾個小節：

(1) Nepexto預充填針筒裝注射劑

步驟 1：做好注射Nepexto預充填針筒裝注射劑前的準備工作

步驟 2：選定注射部位

步驟 3：注射Nepexto預充填針筒中etanercept溶液

步驟 4：丟棄用畢之Nepexto預充填針筒

前言


在開始使用Nepexto預充填針筒裝注射劑之前，以及每次補充新Nepexto預充填針筒裝注射劑時，請閱讀使用說明。除非您的醫生或護理師告訴您如何進行注射，否則請勿嘗試自行注射。

請勿將本品溶液與任何其他藥物混合。

本品包裝內容不包括：

- 紗布墊和繃帶
- 尖銳物品收集盒

裝置圖示



步驟 1：做好注射Nepexto預充填針筒裝注射劑前的準備工作

選定一塊乾淨、光線充足、平坦的桌面，並收集您需要的所有物品：

1. 將裝有Nepexto預充填針筒裝注射劑紙盒從冰箱中取出，並將其放在平坦的桌面上。
取出一支預充填針筒裝注射劑和一份酒精棉片，然後將它們放在桌面上。
請勿搖晃預充填針筒裝注射劑。
將其餘的預充填針筒裝注射劑連同紙盒放回冰箱。
請參閱仿單第6.3節(儲存之特別注意事項)有關如何儲存Nepexto的說明。
如果您對儲存有任何疑問，請聯繫您的醫生，護理師或藥師以獲取進一步的說明。

2. 檢視預充填針筒藥液：

- 通過觀察預充填針筒檢視藥液。
- 藥液應為澄清、無色至乳白色或淡黃色，並且可能包含小的白色或幾乎透明的蛋白質顆

粒。

- 如果溶液變色，混濁或存在上述顆粒以外的情形，請勿使用。

3. 讓預充填針筒裝注射劑回到室溫：

從冰箱內取出的預充填針筒，需於室溫中靜置至少15~30分鐘再使用。

這對於讓注射藥劑更容易和更舒適而言很重要。

- 在準備注射之前，請勿取下針頭蓋。
- **切勿**使用微波爐或熱水等熱源來加熱Nepexto預充填針筒。

4. 準備注射用所需要的配件。這些包括從盒中酒精棉片、棉球或紗布。


5. 用肥皂及溫水洗手。

步驟 2：選定注射部位

1. 三個建議的注射部位為(1)大腿前面的中段；(2)腹部及(3)上臂**外側**(見圖示)。

如果您注射部位為腹部，請選擇距離肚臍5公分範圍外的區域。

如果您是自行注射，請勿選擇注射在上臂外側。



2. 每次新的注射請選擇不同的注射位置。每次新的注射應距離前一次注射位置距離至少3公分以上。請勿注射在皮膚有發紅、變硬、淤青或稚嫩的區域。請勿注射在有疤痕或妊娠紋的區域。(將最近幾次的注射位置記錄下來，可能會很有幫助)
3. 如果您患有乾癬，請不要直接注射在任何凸起、變厚、發紅或有鱗屑的皮膚上(乾癬病灶皮膚)。

步驟 3：注射Nepexto預充填針筒中etanercept溶液

1. 用酒精棉以畫圈的方式清潔注射部位。在注射之前，請不要再碰觸這個區域。


2. 從平坦的桌面上拿起預充填針筒注射劑。筆直地取下針蓋。

取下針蓋過程中，請小心不要彎折或扭曲到針蓋，以避免傷害到針頭。

移走針蓋時可能會從針頭滴出液體，這是正常現象。


請勿碰觸到針或讓針碰觸到任何地方。

請勿觸碰或撞擊針筒的推桿。如此做會造成液體漏出。




3. 當皮膚清潔部位已經乾燥，用一隻手緊捏住皮膚。再用另一隻手像握筆一樣握住預充填針筒。

4. 在45度到90度角度快速將針插入皮膚。在經驗中，你可以發現哪一個角度對你或小孩最舒服。請小心將針插入皮膚，動作勿太慢或太用力。



5. 當針完全插入皮膚後，請放開之前緊捏住皮膚的手。用你空出的手握著預充填針筒底端讓它穩住。慢慢穩定地推針筒推桿進行注射etanercept溶液。



6. 當針筒已空，請小心用剛才的角度拉出針頭。在注射部位可能會有一點出血。你可以用棉球或紗布按壓注射部位10秒。不要揉注射部位。如果必要可以用繃帶覆蓋注射部位。


步驟 4：丟棄用畢之Nepexto預充填針筒

預充填針筒的注射劑是單次使用。

針筒與針頭切勿重複使用。

請勿蓋回針頭蓋。

請依照您的醫師、護理師或藥師指示處理針頭和針筒。



若有任何問題或更多資訊，請詢問您的醫師、護理師或藥師。

(2) Nepexto預充填注射筆的使用說明

步驟 A：做好注射Nepexto預充填注射筆前的準備工作

步驟 B：注射Nepexto預充填注射筆中etanercept溶液

步驟 C：丟棄用畢之Nepexto預充填注射筆

前言

在開始使用Nepexto預充填注射筆之前，以及每次補充新Nepexto預充填注射筆時，請閱讀使用說明。除非您的醫生或護理師告訴您如何進行注射，否則請勿嘗試自行注射。

本品包裝內容不包括：

- 紗布墊和繃帶
- 尖銳物品收集盒

步驟 A：做好注射Nepexto預充填注射筆前的準備工作


選定一塊乾淨、光線充足、平坦的桌面，並收集您需要的所有物品：

1. 將裝有Nepexto預充填注射筆紙盒從冰箱中取出，並將其放在平坦的桌面上。
取出一支預充填注射筆和一份酒精棉片，然後將它們放在桌面上。
請勿搖晃預充填注射筆。
將其餘的預充填注射筆連同紙盒放回冰箱。
針頭蓋一旦移除之後，切勿再將其蓋回。

請參閱仿單第6.3節(儲存之特別注意事項)有關如何儲存Nepexto的說明。

如果您對儲存有任何疑問，請聯繫您的醫生，護理師或藥師以獲取進一步的說明。

- 切勿使用已超過有效期限的預充填注射筆。
- 如果預充填注射筆曾掉落在堅硬的表面上，切勿使用（其內部的組件可能會損壞）。
- 如果預充填注射筆缺少粉紅色針頭蓋或未固定於預充填注射筆上，切勿使用。



2. 檢視預充填注射筆藥液：

通過觀察檢視窗口檢視藥液。

- 藥液應為澄清、無色至乳白色或淡黃色，並且可能包含小的白色或幾乎透明的蛋白質顆粒。
- 如果溶液變色，混濁或存在上述顆粒以外的情形，請勿使用。

3. 讓預充填注射筆回到室溫：

從冰箱內取出的預充填注射筆，需於室溫中靜置至少30分鐘再使用。

這對於讓注射藥劑更容易和更舒適而言很重要。

- 在準備注射之前，請勿取下針頭蓋。
- **切勿**使用微波爐或熱水等熱源來加熱Nepexto預充填注射筆。

4. 選定注射部位：


Nepexto預充填注射筆為皮下注射使用。

建議的注射部位為大腿前面的中段、腹部及上臂外側。

每次新的注射請選擇不同的注射位置。


如果您選擇注射在腹部區域，請確定您所選擇的位置距離肚臍至少5公分以上。

- 請勿注射在皮膚有發紅、變硬、淤青或稚嫩的區域。
- 請勿注射在有疤痕或妊娠紋的區域。
- 如果您患有乾癬，請不要直接注射在任何凸起、變厚、發紅、有鱗屑的皮膚或病灶皮膚上。



步驟 B：注射Nepexto預充填注射筆中etanercept溶液


第一步：用肥皂及清水將雙手洗淨。



第二步：用酒精棉擦拭注射部位。


請依照「4. 選定注射部位」，來選擇注射部位。

- 在注射之前，請不要再碰觸這個區域。




第三步：拿起預充填注射筆，以直接拉開的方式移除針頭蓋，並將針蓋丟棄於垃圾桶或是尖銳物品收集盒。

- 為避免注射筆中的針頭受損，移除針頭蓋的過程，請勿扭曲或彎折針頭蓋。
- 針頭蓋一旦移除後，切勿再將其蓋回。




第四步：輕輕撐開乾淨的注射部位之皮膚。
以與注射部位成直角(90°)的方式握住預充填注射筆。

- 不要捏皮膚。
- 撐開皮膚以形成緊實的表面。




第五步：將預充填注射筆緊壓在皮膚上，以便開始注射。
注射開始時，您會聽到一次喀嗒聲。
請繼續握住預充填注射筆並緊壓在您的皮膚上，直到聽到第二次喀嗒聲。



第六步：在聽到第二次喀嗒聲後，慢慢倒數15秒，確保注射完成。


- 在注射完成前請勿釋放施於注射部位的壓力。
- 在注射期間，請勿移開預充填注射筆。



第七步：從皮膚上移除空的預充填注射筆。

針頭安全保護裝置將會完全覆蓋針頭。

確認注射筆的檢視窗口為粉紅色，以確認劑量完全投予。




步驟 C：丟棄用畢的Nepexto預充填注射筆

將空的預充填注射筆丟進尖銳物品廢棄盒

依照您的醫師、護理師或藥師指示了解尖銳物品廢棄盒的使用方式。

- 請勿將銳器容器放入家用垃圾中。
- 不要回收利用。
- 將容器放在遠離兒童視線和可觸及範圍的位置。



注射部位照護：

如果注射部位出血，請在注射部位按壓紗布墊。

- 不要揉注射部位。
- 如果必要可以用繃帶覆蓋注射部位。

如果您有任何疑問或需要進一步的信息，請諮詢您的醫生，護理師或藥師。

版本：202202V1/1081002

廠名：Lupin Limited (Biotech Division)

廠址：Gat No. 1156, Village Ghotawade, Taluka-Mulshi, Pune
412115 Maharashtra, India

藥商：台灣邁蘭有限公司

地址：台北市信義區信義路五段7號27樓

電話：02-66031688

 **Mylan**

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

