

食品添加物使用範圍及限量暨規格標準第二條

附表一修正規定

第(八)類 營養添加劑

編號	品名	使用食品範圍及限量	使用限制
111	乳酮糖 Lactulose	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可用於標示有每日食用限量之食品，每日食用量，其乳酮糖總含量不得高於 10 g。	限於補充食品中不足之營養素時使用。
251	單水硫酸亞鐵(乾燥) Ferrous Sulfate Dried (Monohydrate) (Iron (II) Sulfate Dried (Monohydrate))	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於 45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每 300 g 食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於 22.5 mg。 3.嬰兒(輔助)食品，在每日食用量或每 300g 食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於 15 mg。 4.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。

第(十一)類 調味劑

編號	品名	使用食品範圍及限量	使用限制
060	檸檬酸二氫鈉 Sodium Dihydrogen Citrate	本品可於各類食品中視 實際需要適量使用。	限於食品製 造或加工必 須時使用。

食品添加物使用範圍及限量暨規格標準第三條 附表二修正規定

第(八)類 營養添加劑

§ 08251

單水硫酸亞鐵

Ferrous Sulfate, Dried

定 義 乾燥硫酸亞鐵主要由單水合物組成，含少量四水合物

化 學 式 : $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 $\text{FeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

分 子 量 : 單水合物：169.91
四水合物：223.91

含 量 : 86~89%(以 FeSO_4 計)。

外 觀 : 灰白色至淺黃色粉末。

特 性

鑑 別

溶 解 度 : 緩慢溶於水；不溶於乙醇。

鐵 : 通過試驗。

硫 酸 鹽 : 通過試驗。

純 度

酸 不 溶 物 : 0.05%以下。

鉛 : 2 mg/kg 以下。

汞 : 1 mg/kg 以下。

分 類 : 食品添加物第（八）類。

用 途 : 營養添加劑。

第(十一)類 調味劑

§ 11060


檸檬酸二氫鈉

Sodium Dihydrogen Citrate

別 名 : Monosodium citrate ; sodium citrate
monobasic ; INS No. 331(i)

定 義
化 學 名 稱 : Monosodium citrate ; monosodium salt of
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

化 學 式 : $C_6H_7NaO_7$



分 子 量 : 214.11

含 量 : 99.0~101.0%。

外 觀 : 白色，無臭結晶或結晶性粉末。

特 性

鑑 別

溶 解 度 : 易溶於水；幾乎不溶於乙醇。

p H 值 : 3.4-3.8 (1:10 水溶液)。

檸 檬 酸 鹽 : 通過試驗。

鈉 鹽 : 通過試驗。

純 度

乾 燥 減 重 : 0.4%以下 (105°C，4 小時)。

草 酸 鹽 : 取本品之水溶液(1→10)10 mL，加稀醋酸(1
N)5 滴及氯化鈣試液 2 mL，於 1 小時內未產生

混濁。

鉛：2 mg/kg 以下。

分 類：食品添加物第（十一）類。

用 途：調味劑。